


Prix : 1 fr. 50

GRATIS POUR NOS CLIENTS

LISTE
DES
PLANTES DE MONTAGNES
ET
PLANTES VIVACES
ÉLEVÉES AU
JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION
DE GENÈVE

H. CORREVON

Suisse

Terrestria sidera, flores.

GENÈVE
IMPRIMERIE J. STUDER, ROND-POINT DE PLAINPALAIS, 3
—
1893

2428

AVIS

Le **Jardin alpin d'Acclimatation** est situé à deux pas de la Mairie et du Temple de Plainpalais, à l'entrée du chemin Dancet et à l'angle sud de la Plaine. Sa **succursale** se trouve aux Grands-Acacias, à la station du tramway pour Lancy.

Il fut fondé en 1884 par une Société qui vient de me le céder, en sorte que j'en suis maintenant seul propriétaire. J'espère que les clients et amis de notre Jardin m'aideront, en le favorisant par leurs achats, à le maintenir et à en faire un des moyens d'action les plus puissants en faveur de la propagation des cultures de plantes rustiques.

H. CORREVON

Nous faisons des Collections de Plantes à notre choix aux conditions suivantes :

100	plantes alpines, *à notre choix*	Fr.	40 —
50	» » »	»	20 —
25	» » »	»	10 —
100	plantes vivaces pour plates-bandes, *à notre choix* .	Fr.	40 —
50	» » » » » .	»	20 —
25	» » » » » .	»	10 —

LISTE

DES

PLANTES DE MONTAGNES

ET DES

PLANTES VIVACES

ÉLEVÉES AU

JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION DE GENÈVE

R. = Rocaille. Pl. t. = Pleine terre. S. = Soleil.
O. = Ombre.

Acæna

adscendens Vahl.	— 50
argentea R. et P. . . .	— 50
microphylla Lindl. . . .	— 50
ovalifolia R. et P. . . .	— 50
ovina Cuningh. . . .	— 50
pinnatifida R. et P. . . .	— 50
Sanguisorbæ Vahl. . . .	— 50
sarmentosa Carm. . . .	— 50
sericea Jacq.	— 50
splendens	2 50

Plantes fort curieuses de la famille des Rosacées, originaires des montagnes de l'Amérique du Sud, d'Australie et des régions antarctiques. Elles sont naines et rampantes et conviennent admirablement à la confection des bordures et à la décoration des rocailles. Soleil ou mi-soleil.

Acantholimon

acerosum Boiss.	5 —
androsaceum Boiss. . . .	5 —
glumaceum Boiss. . . .	2 50
venustum Boiss. . . .	2 50

Très jolies plantes des montagnes d'Orient, à belles fleurs rose vif, à feuillage glauque et terminé en pointes aiguës; voisines du genre *Statice*. R.; S.

Acanthus

longifolius Poir	1 —
Lusitanicus	1 —
mollis L.	1 —
Schottii Hort.	1 —
spinosissimus Pers. . .	1 —
spinosus L.	1 —

Les Acanthes sont de superbes plantes décoratives dont les fleurs et les feuilles constituent un bel ornement pour nos jardins. Elles prennent un grand développement et leur place est dans les grandes rocailles ou dans les coins pittoresques des jardins. Il leur faut le plein soleil.

Aceras (Voir le Cat. Foug. et Orchid. rustiq.)

Achillea

1	ageratifolia Sibth. . .	1 —
2	ageratum L.	— 50
3	Aizoon Boiss. (anthemis aiz.) .	1 50
4	atrata L.	1 50
5	Clavennæ L.	1 —
6	Clusiana Tausch. . . .	2 50
7	Clypeolata Sibth. . . .	— 50
8	Chritmifolia W. K. . . .	— 50
9	Eupatorium Bieb. . . .	— 50
10	filicifolia Bieb. . . .	— 50
11	filipendulina Lam. . .	— 50

Achillea (*suite*).

12 Gerberi Bieb. . . . . . — 50
13 Herba Rota All. . . . . 1 —
14 Impatiens L. . . . . . 1 —
15 Ligustica All. . . . . . — 50
16 lingulata W. K. . . . 1 —
17 macrophylla L. . . . . — 50
18 magna L. . . . . . . — 50
19 micrantha Bieb. . . . — 50
20 millefolium L. . . . . — 50
21 — purpureum. — 50
22 moschata L. . . . . . 1 —
23 nana L. . . . . . . 1 —
24 nobilis L. . . . . . . 1 —
25 ochroleuca Ehr. . . . — 50
26 pectinata Willd. . . . — 50
27 Ptarmica L. . . . . . — 50
28 » à fleurs doubles. . — 50
29 pyrenaica Sibth. . . . — 50
30 Reichardiana Beck. . . 2 50
31 santolinoides Lag. . . — 50
32 Sudetica Opiz. . . . — 50
33 sulfurea Boiss. 1 50
34 tomentosa L. . . . . . — 50
35 umbellata Sibt. et Sm. . 2 —

Les Achillées ou Millefeuilles sont des plus viv., à port nain ou élevé, à tiges dressées ou rampantes, à fleurs agglomérées en capitules plus ou moins larges, jaunes ou blanches, rarement roses; elles fleurissent de mai en septembre. Ce sont généralement des plantes robustes et de culture facile.

Les nos 4, 6, 13, 22, 23 et 30 sont des plantes alpines aromatiques connues sous les noms de Génepi noir; feuillage plus ou moins divisé, port nain et touffu, fleurs blanches. R.; mi-s. ou s. Eviter l'humidité stagnante.

Nos 1, 3, 5 et 35 offrent des feuillages tomenteux-argentés et des fleurs blanches; port nain et touffu. Bordures ou R.; s.

Le no 34 est une bonne plante à bordures ou à rocailles, à feuillage finement divisé, à fleurs jaune d'or, se succédant tout l'été et à port ras et touffu. S.

Nos 2, 7, 12, 19, 25, 31 et 33 sont à fleurs jaunes et à tiges médiocrement élevées, tandis que les nos 9, 10 et 11, à fleurs jaunes d'or, élégamment disposées en gros capitules, forment de fortes touffes de près d'un mètre à 1m 1/2 (très ornementales). Ce sont de bonnes plantes vivaces pour la pl. terre.

Les nos 4, 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29 et 32 sont à fl. blanches et à port peu élevé, assez touffu, tandis que le no 18, à fl. blanches également, est une grande espèce à feuillage grisâtre et à larges ombelles serrées. Pl. t. ou R.; s. ou mi-s.

No 17, Pl. alpine croissant dans la rocaille, à l'ombre; fl. blanches. Nos 14 et 16 sont des espèces curieuses, à fl. blanches. R.; mi-s.

Aconitum

1 Anthora L. . . . . . . — 50
2 Cammarum Jacq. . . . — 50
3 cernuum Reich. . . . — 50
4 ferox Wall. 1 50
5 Halleri Reich. . . . . — 50
6 Japonicum Thumb. . . — 50
7 Lycoctonum L. . . . . — 50
8 Napellus L. . . . . . — 50
9 ochranthum C. A. M. . 1 50
10 ochroleucum Willd. . . — 50
11 orientale Mill. . . . . — 50
12 paniculatum Lam. . . — 50
13 pygmaeum Vest. . . . 1 50
14 pyrenaicum Lam. . . . — 50
15 septentrionale Kœll. . . 1 50
16 tauricum Wulf. . . . . — 50
17 theriophonum Reich. . — 50
18 uncinatum L. . . . . . — 50
19 variegatum L. . . . . . — 50
20 volubile Kœll. . . . . . — 50

Les Aconits (Char de Vénus) sont d'importantes plantes vivaces propres à la décoration des plates-bandes, rocailles et jardins pittoresques; leurs fleurs, de forme curieuse, sont disposées en épis dressés, simples ou paniculés; elles sont jaunes chez les nos 1, 7, 9, 10 et 14, couleur lie de vin chez no 15, et bleu plus ou moins foncé ou violacé chez les autres; chez no 19, la fleur est panachée de bleu et blanc. Ils fleurissent de juin en octobre et aiment un sol meuble et profond, riche en humus.

Acorus

Calamus L. (pl. aquatique, aromatique). 50
gramineus Ait. 1 50

Actæa

Cimicifuga L. (Cim. fœtida L. . — 50
racemosa L. (Cim. racemosa Bart.) — 50
spicata L. . . . . — —
— à fruits blancs . . 2 50
— à fruits rouges . . 2 50

Les Actées sont des plantes d'ombre, à

beau feuillage ornemental, hautes de 48-80 cm., à petites fleurs blanchâtres, réunies en épis ou en grappes et auxquelles succèdent des baies souvent très belles. R. ou pl. t.

Adenophora

coronata A. DC. . . . . . — 50
denticulata Trautv. . . . — 50
latifolia Fisch. . . . . . — 50
liliifolia Led. . . . . . — 50
stylosa Fisch. . . . . . — 50
tricuspidata A. DC. . . . — 50

Grandes campanulées à petites fleurs disposées en grappes plus ou moins développées ou étalées; mai-septembre. 50 c. à 1 m. R. ou pl. t.; Soleil.

Adenostyles

albifrons Reich. . . . . . — 50
alpina Bl. et F. . . . . . — 50
leucophylla Reich. 1 50

Composées ornementales à grandes feuilles décoratives, à fleurs rose purpurin, disposées en panicules, 30 cm. à 1 m. 50. R. ou pl. t. Ombre et fraîcheur.

Adiantum (Voir le Catal. des Foug. et Orch. rustiq.)

Adonis

pyrenaica DC. (rare) . . . 1 50
vernalis L. . . . . — 50

L'une des plus belles fl. du premier printemps; un vrai soleil d'or, porté sur une tige de 10-25 cm.; feuillage finiment divisé. R. ou pl. t. Plein soleil.

Æthionema

cordifolium DC. . . . . — 50
grandiflorum Boiss. . . . — 50
iberideum Boiss. (à grandes fleurs d'un blanc pur) . . 1 —
persicum Boiss. . . . . 1 —
pulchellum Boiss. . . . . — 50
saxatile L. . . . . — 50
Thomasianum Gay. . . . 2 50
(Très curieuse et rarissime espèce piémontaise.)

Charmantes crucifères à fleurs généralement roses, formant de petits arbustes nains ou rampant sur le sol. R. ou pl. t.; s. Avril-juillet.

Agrimonia

repens L. . . . . — 50
suaveolens Pursh. . . . . — 50

Ajuga

genevensis L. à fleurs roses (Bugle rose) . . . . . — 50
pyramidalis L. . . . . . — 50
reptans à f. panachées . . — 50

Alchemilla

alpina L. . . . . — 50
conjuncta Bab. . . . . . — 50
fissa Schum.. . . . . . — 50
pentaphyllea L. . . . . — 50
pubescens Bieb. . . . . — 50
splendens Gaud. . . . . — 50
vulgaris L. . . . . — 50

Les Alchémilles sont de petites rosacées montagnardes aux fleurs insignifiantes, mais au feuillage délicat et ornemental. R.; s. ou mi-s.

Alfredia

cernua Cas. . . . . — 50
nivea Karr. . . . . — 50
stenolepis Boiss. p. t.; s. . — 50

Althæa

sulfurea Boiss. et Held. . — 50

Rose trémière à fl. jaune simple. Pl. t.; s.

Allium

acutangulum Schrad. . . . — 50
albidum Fisch. . . . . . — 50
ambigum Sibt. et Sm. . . . — 50
ambliophyllum Kar. et Kir. — 50
carinatum L. . . . . . . — 50
caucasicum Bieb. . . . . — 50
cilicicum Boiss. . . . . . — 50
cœrulescens Don. (azureum Led.) . . . . — 50
fallax Schult. . . . . . . — 50
flavescens Bess. . . . . — 50
flavum L. . . . . — 50
fragrans Vent. . . . . . — 50
giganteum A. Gray. . . . 1 —
globosum Bieb. . . . . . — 50
Karataviense Rgl. . . . . — 50
laceratum Freyn. . . . . — 50
Ledebourianum Schult. . . — 50
Moly L. . . . . — 50
moschatum L. . . . . . . — 50
narcissiflorum Willd. . . . — 50
neapolitanum Cyr. . . . . — 50
nebrodense Guss. . . . . — 50
nigrum L. . . . . — 50
ochroleucum W. et K. . . — 50

Allium *(suite).*
oreophyllum C. A. M. . . . 1 50
Ostrowskyanum Rgl. . . . 1 50
pallens L. . . . . — 50
pedemontanum L. 1 50
pulchellum Don . . . . . — 50
roseum L. . . . . — 50
rotundum L. . . . . . . — 50
Schœnoprasum L. . . . . — 50
sphærocephalum L. . . . — 50
Steveni Willd. . . . . . — 50
strictum Gaud. . . . . . — 50
subhirsutum L. . . . . — 50
tenuifolium Ten. . . . . — 50
tulipifolium Led. . . . . — 50
Ursinum L. . . . . — 50
Victoriale L. (herbe à neuf chemises) — 50

Les A. flavescens, flavum, Moly, sont de belles espèces à fleurs jaunes; cœrulescens est bleuâtre et les autres espèces blanc, blanc rosé ou verdâtre, rose plus ou moins vif ou lilas ; le giganteum est une espèce hautement ornementale et dont la hampe florale atteint parfois 1 m. 1/2; les A. oreophyllum, Ostrowskyanum et pedemontanum, à belles grandes fleurs rose pourpre, sont les plus brillantes.

Les Ails conviennent à la décoration des roches et talus arides; et sauf Ursinum et Victoriale qui demandent l'ombre et la fraîcheur, tous aiment le soleil.

Allosorus (Voir catalogue Foug. et Orch. rustiq.)

Alsine
austriaca W. K. 1 50
Cherleri Fenzl. 1 50
Gerardi Willd. . . . . . — 50
lanceolata M. K. 2 50
laricifolia Crantz. . . . — 50
liniflora Heg. . . . . . — 50
pinifolia Fenzl. 1 50
recurva Wahl. . . . . . 1 —
Rosani Fenzl. . . . . . 1 —
saxatilis Crantz. . . . . — 50
verna L. . . . . — 50

Petites herbes touffues à fleurs blanches, à feuillage fin. R.; s. ou mi-s.

Alyssum
1 alpestre L. 1 50
2 argenteum Vitm. . . . . — 50
3 Gemonense L. . . . . . — 50
4 Heinzii Ulpit. 2 50
5 Mœllendorfianum Beck. . 2 50

Alyssum *(suite).*
6 montanum L. . . . . . . — 50
7 Nebrodense Tineo 1 50
8 orientale Ard. . . . . . — 50
9 pyrenaicum Lap. 2 50
10 repens Baumg (Rocheli Andr.) 1 50
11 rostratum Stev. . . . . — 50
12 saxatile L. (Corbeille d'or) . . — 50
13 speciosum 1 50
14 spinosum L. 1 50
15 Transylvanicum Schur. . . 1 50
16 Wiersbicki Heuf. . . . . — 50
17 Wulfenianum Willd. . . . 1 50

Les Alysses sont des plantes saxatiles très propres à garnir les fentes de rochers au mi-soleil; nos 1, 4, 5, 6, 10, 15 et 17 sont des espèces naines et rampantes à fl. jaunes; no 9 est une rarissime pyrénéenne à fl. blanches; 14, fl. blanches et petit arbuscule de 5 à 10 cm. de haut; 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13 et 16 sont des plantes touffues, hautes de 15 à 50 cm., à fleurs jaunes et qui peuvent également servir à la confection de bordures. Ces plantes fleurissent généralement d'avril en juin.

Althæa officinalis L. (Guimauve) . — 50

Amaryllis lutea L. (Sternbergia lutea) — 50

Sorte de Crocus jaune vif, fleurissant à l'arrière automne.

Amelanchier (Voir Aronia)

Amphoricarpus Neumayeri Vit. 2 50

Superbe composée tomenteuse qui croît dans les Alpes de la Transylvanie et se traite comme l'Edelweiss dont elle offre plusieurs des caractères.

Amygdalus nana L. 1 50

Amandier rose nain et traînant.

Anacamptis (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Anchusa
1 ochroleuca Sweet. . . . . — 50
2 Italica Retz. . . . . . — 50
3 sempervirens L. . . . . — 50
4 stylosa Bieb. . . . . . — 50

Les Buglosses sont de fortes Bourraches vivaces à fleurs d'un très beau bleu chez les nos 2, 3 et 4, jaunes chez no 1. P. t.; sol profond.

Andromeda
calyculata L. 2 50
Japonica Thunb. . . . . . 5 —
polyfolia L. 1 50

Plantes de la famille des Bruyères, à

Andromeda *(suite)*.
fleurs globuleuses, blanches chez les deux premières, rose chair chez la dernière espèce et qui exigent la tourbe ou la terre de bruyère; éviter tout contact avec le calcaire.

Androsace

1	Albana Stev.	1	50
2	carnea L.	—	50
3	chamæjasme L.	1	—
4	Charpentieri Heg. . . .	5	—
5	Chumbyi Hort.	1	50
6	ciliata DC.	2	50
7	coronopifolia Ait (lactiflora) .	—	50
8	cylindrica DC.	2	50
9	foliosa Duby.	1	50
10	glacialis Hoppe. . . .	1	50
11	Helvetica Gaud. . . .	1	50
12	imbricata Lam. (tomentosa ou argentea).	5	—
13	lactea L.	—	50
14	Laggeri Huet.	—	50
15	lanuginosa Wall.	1	50
16	obtusifolia L.	—	50
17	oculata Hort.	—	50
18	Pacheri Leyb.	5	—
19	pubescens DC.	1	50
20	pyrenaica Lam.	5	—
21	sarmentosa Wall. . . .	—	50
22	strigillosa Franchet . .	5	—
23	villosa L.	—	50
24	vitaliana Lap. (Aretia) .	1	—
25	Wulfeniana Leyb. . . .	5	—

Ce sont les plus caractéristiques d'entre les pl. alpines et ce qu'on peut appeler les plus alpines des pl. de montagne; elles forment souvent de petites touffes serrées et comprimées qui se recouvrent de fleurs, si bien qu'on les a nommées des pélotes fleuries. Les n°s 4, 6, 10, 18 et 25 sont des plantes de très hautes régions, qu'il faut cultiver dans les fentes des rochers, à mi-soleil ou dans des niches sèches et bien drainées; les n°s 8, 11, 12, 19 et 20 sont encore plus délicates et exigent la position perpendiculaire; elles réussissent bien dans les fentes des vieux murs, au soleil; pour les n°s 2, 3, 14, 16 et 24. il faut une niche au mi-soleil et un sol léger ($^1/_3$ terre de bruyère, $^1/_3$ terreau de feuilles, $^1/_3$ terre franche); les n°s 13 et 23 exigent un sol calcaire et les espèce himalayennes (n°s 5, 9, 15, 17, 21 et 22) la rocaille bien exposée au soleil et un sol léger et poreux; enfin les n°s 1 et 7 sont des plantes annuelles.

Andryala lanata L. (Voir Hieracium lanatum).

Anemone

1	acutiloba DC (Hepatica acut.) .	—	50
2	alpina L.	—	50
3	albana Stev.	1	—
4	angulosa Lam. (Hepetica ang.).	—	50
5	apennina L. (Sylvie bleue). .	—	50
6	— alba.	1	50
7	— atroviolacea . .	1	50
8	Baïkalense Fisch. . . .	1	50
9	Baldensis L.	1	—
10	blanda Schott (Sylvie azurée) .	1	—
11	decapetala L.	—	50
12	elegans Dcsne.	—	50
13	fulgens Gay.	—	50
14	Halleri All.	1	50
15	Hepatica L. (Hep. triloba).	—	50
16	» à fl. rose vif, doubles .	—	50
17	» » bleu foncé, doubl. .	—	50
18	» » rose clair . .	—	50
19	» » rose foncé . .	—	50
20	» » bleu foncé . .	—	50
21	» » blanches . .	—	50
22	Japonica Sieb.	—	50
23	» Honorine Jobert. .	—	50
24	intermedia Winkl. (Sylvie souf.)	1	50
25	Magellanica Janc. . . .	—	50
26	montana L..	—	50
27	multifida DC.	—	50
28	» rubrum Janc. . .	—	50
29	» alba Janc. . . .	—	50
30	narcissiflora L.	—	50
31	nemorosa L. (Sylvie) . .	—	50
32	» à fleurs doubles . .	—	50
33	palmata L.	1	—
34	patens L.	1	—
35	pratensis L.	—	50
36	» obsoleta	1	50
37	» nigricans Janc. . .	1	50
38	pensylvanica L.	—	50
39	polyantha Don.	1	50
40	pulsatilla L. (Pulsatille) .	—	50
41	» pinnatifida Rgl. . .	1	50
42	ranunculoïdes L. (Sylvie jaun.).	—	50
43	rivularis Buch..	—	50
44	Robinsoniana Hort. . .	—	50
45	rubra Jord	—	50
46	sulfurea L.	—	50
47	sylvestris L.	—	50
48	Transylvanica Heuf. (Hep. Trans.)	1	50
49	trifoliata L..	1	—
50	vernalis L.	—	50

Anemone (*suite*).

51 virginiana L. . . . . . — 50

Les nos 5, 6, 7, 24, 31, 32, 42, 44 et 49, qui rentrent dans la catégorie des Sylvies de nos bois, aiment le mi-ombre et la fraîcheur; en les mélangeant dans un taillis on obtient un effet charmant par le contraste de leurs gracieuses fleurs blanches, roses, bleu d'azur ou jaunes; elles font également bien dans les rocailles. Nos 1, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 48, qui sont des Hépatiques, recherchent le sol calcaire, le mi-ombre ou mi-sol. et la chaleur. Ces deux catégories de plantes produisent des fleurs au premier printemps, de Mars en Avril, et sont d'entre les plus précieuses des fleurs vernales. On les met en plates-bandes ou en rocailles. Nos 2, 14, 30, 39, qui sont des plantes de la région montagneuse, exigent un sol léger, poreux, profond, et le mi-soleil; r. ou pl. t. Les nos 46 et 50, qui rentrent dans cette catégorie, veulent la terre de bruyère et la tourbe et craignent la chaux. Toutes fleurissent de Mars en Mai. Nos 3, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 50 et 51 aiment le grand soleil et un sol meuble et sain; r. ou pl. t. Les nos 12, 22 et 23 fleurissent en automne; les autres plutôt de Mai en Juin-Juillet. Le no 9 est une plante des hautes altitudes qui veut la terre de bruyère ou la tourbe, la rocaille et le mi-soleil. Toutes sont des plantes belles, ornementales et intéressantes qui méritent d'être cultivées partout.

Anagallis

tenella L. 2 50

Pl. marécageuse rare et intéressante.

Anarrhinum

bellidifolium Willd. . . . — 50

Angelica

dahurica Fisch. . . . . . — 50

Antennaria

dioica L. . . . . — 50

Petite Immortelle rose ou blanche.

hyperborea Don. 1 50

plantaginea R. Br. des Alpes . — 50

Anthemis

Aizoon Gris (V. Achillea).

Biebersteini Adam. . . . . 1 —

Carpathica W. K. (A. Styriaca). 1 —

Kitaibelii Spr. 1 50

Anthemis (*suite*).

Kotschyana Boiss. . . . . 1 —

montana L. . . . . 1 —

nobilis L. . . . . — 50

santolinoides Mumby. . . . 1 —

tenuifolia Schur. 1 50

Les Anthemides sont des Camomilles à grandes fleurs solitaires se rapprochant des Pyrèthres, et dont les fleurs ont l'aspect de belles marguerites blanches ou jaune vif. R. ou pl. t.; soleil. Elles fleurissent l'été.

Anthericum

algeriense Boiss.. . . . . . 1 —

floribundum Aït. . . . . 1 —

Liliago L. . . . . — 50

liliastrum (V. Paradisia).

plumosum R. P.. . . . . . 1 —

racemosum L. . . . . . . — 50

Les Antherics sont des lis à petites fleurs blanches très voisines des Paradisies. R. ou pl. t.; soleil.

Anthyllis

alpestris Heg. . . . . . . — 50

Baldensis Kern. . . . . . . 1 —

Dillenii Schult. . . . . . 1 —

montana L. . . . . — 50

Cette dernière espèce, l'une des plus caractéristiques de notre Salève, est excellente pour garnir les rocailles en plein soleil; elle est basse et rampante, à feuillage gris cendré, et porte, de Mai en Juillet, de nombreuses fleurs d'un rose purpurin.

Anticlea

glauca Kunth. . . . . . — 50

Antirrhinum

Asarina L. 1 50

Belle plante saxatile, recouverte d'une pubescence glanduleuse, à rameaux étalés entre les rocs, rampants et portant à la base des feuilles de grandes fleurs jaune pâle; Mai-Août. R.; s.

Aphyllanthes

monspeliensis L. 1 50

L'une des jolies plantes des Alpes et des rochers du Midi; c'est presque un jonc portant des fleurs lilas. R.; s.

Apios

tuberosa Moench. . . . . 1 —

Plante grimpante ressemblant à un Haricot vivace.

Aplectrum (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Aquilegia

1	advena Fisch.	—	50
2	alpina L.	1	—
3	arctica Hort. Loud. (V. A. Formosa).		
4	atrata Koch.	—	50
5	atropurpurea Willd.	—	50
6	Bertoloni Schott.	1	—
7	Burgeriana Sieb.	1	—
8	californica Lindl.	1	—
9	canadensis L.	—	50
10	» nana Hort.	—	50
11	carniolica	—	50
12	chrysantha A. Gray	—	50
13	» alba Hort.	1	50
14	» bicolor Hort.	1	—
15	cœrulea James	1	50
16	» hybrida Hort.	1	—
17	Einseleana F. Schultz	—	50
18	flabellata Hort.	1	—
19	flavescens	—	50
20	Formosa Fisch. (artica)	2	50
21	glandulosa Fisch.	1	50
22	grata Mey	1	—
23	Haenkeana Held	1	—
24	jucunda Fisch	—	50
25	Kitaibeliana Schult.	1	—
26	lactiflora Kar.	—	50
27	leptoceras Nutt.	1	—
28	longicalcarata Rgl.	1	—
29	nevadensis Boiss. et Reut.	1	—
30	nigricans Brüg.	1	50
31	Olympica Boiss.	—	50
32	oxypetala Traut.	1	—
33	pyrenaica DC	1	—
34	Skinneri Hook.	—	50
35	Stuartii Hort. Ed.	1	50
36	thalictrifolia Schott	1	—
37	viridiflora Pall.	—	50
38	vulgaris L.	—	50
39	» vars	—	50
40	Wittmanniana Hort.	—	50

Les Ancolies sont très précieuses pour la décoration des jardins; elles recherchent les lieux frais et légèrement ombragés, et font merveille dans les taillis et au bord des massifs d'arbres; elles sont d'entre les meilleures plantes vivaces, et fleurissent généralement en Mai-Juin. Les nos 19 et 32 fleurissent en Avril-Mai, et les nos 12, 13, 14, 15, 16, 20 et 27 de Juin en Juillet. Les nos 2, 6, 7, 17, 21, 22, 28, 32, 33 et 35 ont de belles grandes fleurs d'un très beau bleu (sépales bleus avec pétales jaunes chez 32); no 12 est d'un très beau jaune avec de longs éperons; les nos 1, 4, 5, 30, d'un rouge-brun, d'un vert noirâtre chez 37; nos 8, 9, 10, 34 sont d'un rouge brique ou vermillon; no 20 est très particulièrement recommandable à cause de sa fleur allongée rouge vif, verte sur les éperons, qui apparaît en Juillet-Août.

Ce sont des plantes très polymorphes et variables qu'il est souvent difficile de maintenir par le semis.

Arabis

albida Stev. (Corbeille d'argent)	—	50
Allionii DC.	—	50
alpestris Reich.	—	50
alpina L.	—	50
arenosa Scop.	—	50
bellidifolia Jacq.	—	50
blepharophylla Hook. et Arn.	2	50
borealis Andr.	—	50
brassicæformis Wallr.	—	50
bryoides Boiss.	2	50
caucasica Bieb.	—	50
cenisia Reut.	—	50
cœrulea All.	1	50
crispata Willd.	—	50
croatica Schott.	—	50
curtisiliqua DC	—	50
Escholziana Andr.	—	50
Halleri L.	—	50
hybrida Reut.	—	50
japonica Rgl. et Held.	—	50
lilacina Schrad.	—	50
lucida	—	50
ovirensis Wulf.	—	50
petræa Lam.	—	50
procurrens W. K.	—	50
pumila Wulf.	—	50
purpurea Sibth.	—	50
rosea DC	—	50
saxatilis All.	—	50
Scopoliana Boiss.	1	—
Soyeri Huet et Reut.	—	50
suecica Fr.	—	50

Les Arabettes sont des plantes à port nain souvent touffu, à petites fleurs blanches ou roses, disposées en épis dressés. R.; mi-o. ou s.

Arctostaphylos

alpina Sprgl.	1	50
nevadensis A. Gray (californica)	5	—

Arctostaphylos *(suite)*.

Uva ursi Sprgl. (Raisin d'ours) . 1 —

Les Arbousiers de montagnes sont d'entre les plus riches décorations des rochers. Le Raisin d'ours est particulièrement recommandable par son beau feuillage persistant rappelant un peu le buis, bien que plus foncé en couleur, ses jolies fleurs rose chair apparaissant au printemps et l'abondance de grosses baies rouges qui leur succèdent. Il lui faut le calcaire et le plein soleil. Chez l'A. alpina le feuillage est caduc, mais a la propriété, à l'automne, de prendre une teinte rouge qui persiste pendant 6 semaines et fait le plus bel effet; ses fleurs sont blanches et ses baies d'un noir de jai. Mi-ombre; sol siliceux (terre de bruyère ou tourbe).

Arenaria

Balearica L. . . . . — 50

Très petite plante cespiteuse et rampante, propre à garnir les vieux murs; fl. blanches.

cæspitosa Ehrh. . . . . . — 50
ciliata L. . . . . — 50
gracilis W. K. 1 50
grandiflora L. . . . . . — 50
graminifolia Ard. . . . . — 50
montana L. . . . . 1 —
purpurascens L. . . . . . 1 —
rigida Bieb. . . . . . . — 50
rotundifolia Bieb. . . . . — 50

Jolies plantes naines et rampantes, à fleurs blanches (d'un rose lilas chez purpurascens) et qui fleurissent très longtemps. R.; s. ou mi-s.

Aretia

Vitaliana L. (V. Androsace V.).

Arethusa (Voir Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Arisæma

atrorubens 1 50
ringens Schott. 1 50
triphyllum Schott. 1 50

Aristolochia

clematitis L. . . . . . . — 50

Armeria

alpina Willd. . . . . . . — 50
cæspitosa Boiss. 2 50
Halleri Walr. . . . . . . — 50
juncea de Gir. 1 50
plantaginea Willd. . . . . — 50
setacea Boiss. 2 50

Armeria *(suite)*.

sibirica Turcz. . . . . . . — 50
vulgaris L. (Gazon d'Espagne) . . — 50

Ces plantes, de la famille des *Statices*, sont excellentes pour la confection des bordures et très propres à garnir et animer les lieux secs exposés au soleil; fl. d'un rose plus ou moins vif, rassemblées en capitules orbiculaires.

Arnica

montana L. . . . . 1 —

L'Arnica est de culture assez difficile; il lui faut le grand soleil et un air humide; il réussit admirablement dans le sphagnum en pleine lumière.

Chamissonis Less. (des régions boréales) 1 50
foliosa 2 50

Arnebia

echioides DC. (Fleur du Prophète) . 1 50

Aronia

rotundifolia Pess. (Amelanchier) . 1 —

Aronicum

Clusii Koch. . . . . . . 1 —
glaciale Reich. . . . . . 1 —
scorpioïdes Koch. . . . . — 50

Belles composées alpines à grandes fleurs jaunes; Avril-Juin. R. mi-s.

Artemisia

1 austriaca Jacq. . . . . . 1 —
2 Baumgarteni Bess. . . . 1 —
3 camphorata Vill. . . . . — 50
4 dracunculus L. (Estragon) . 1 —
5 glacialis L. . . . . . . 1 —
6 glauca Pall. . . . . . . 1 —
7 gnaphalioides Nutt. . . . — 50
8 granatensis Boiss. . . . 1 50
9 lanata Willd. . . . . . 1 —
10 maritima L. . . . . . . 1 —
11 mutellina L. . . . . . . — 50
12 nitida Bert. . . . . . . 1 —
13 rupestris L. . . . . . . — 50
14 spicata Wulf. . . . . . 1 —
15 Valesiaca All. . . . . . 1 —
16 Villarsii Gr. et Godr. . . 1 —

Les Armoises ou Absinthes de montagnes sont généralement des plantes aromatiques, à feuillage gris argenté, plus ou moins finement divisé, qui font un bel effet dans les rocailles, et dont on fait parfois des bordures dans les jardins. Les nos 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 16, sont des plantes

basses, rampantes, qui appartiennent à la haute montagne et exigent la rocaille et le soleil; il leur faut un sol léger. Le n° 15 est une des plantes les plus caractéristiques du Valais; son feuillage blanc d'argent vif, finement divisé, est l'un des beaux ornements des rochers; il lui faut la rocaille et le plein soleil.

Arum

italicum Mill.	—	50
maculatum L.	—	50
proboscideum L.	1	—
spectabile Schott.	1	—
ternatum Thumb.	1	50
Zeleborii Schott.	1	—

Arundo

Donax L.	—	50

Asarum

canadense L.	—	50
europæum L.	—	50
grandiflorum Lodd.	1	—

Excellentes pour l'ombre; beau feuillage; plantes naines et touffues, propres à former un tapis de verdure dans les pentes des rocailles tournées au nord.

Asclepias

cornuti Dcsne	—	50
curassavica L.	—	50
incarnata L.	—	50
pulchra Arrab.	—	50
purpurascens L.	—	50
tuberosa L.	1	50

Asparagus

acutifolius L.	1	50
davuricus Fisch.	—	50
tenuifolius Lam.	2	50
verticillatus L.	1	—

Asperula

1 athoa Boiss.	2	50
2 cynanchica L.	—	50
3 hexaphylla All.	—	50
4 hirta Sib. et Sm.	—	50
5 longiflora W. K.	—	50
6 nitida Sib. et Sm.	2	50
7 odorata L. (Maitrank)	—	50
8 Taurina L.	1	—

Les Aspérules sont de charmantes plantes; les n°s 1, 2, 3 et 5, exigent la rocaille et le soleil; les n°s 6 et 7 vont fort bien en pleine terre et peuvent même former des bordures à l'ombre; ils sont excellents pour la garniture des rochers omb. Mai-Juin.

Asphodelus

albus Willd.	—	50
cerasiferus Gay	—	50
delphinensis Gr. et God.	1	50
fistulosus L.	—	50
Liburnicus Scop.	—	50
luteus L.	—	50
subalpinus Gr. et God.	1	—
Villarsii Verl.	1	—

Belles Liliacées à tiges élevées de 50 c^{m} à 1^{m},50, à fleurs blanches ou jaunes; Mai-Juillet. Pl. terre ou grandes rocailles; plein soleil.

Asplenium (Voir Cat. Foug. et Orchid rust.).

Aspidium (Idem).

Aster

alpinus L.	—	50
alpinus à fleurs blanches	1	50
» grandiflorus	1	—
» speciosus Rgl.	1	50
amellus L.	—	50
» à fleurs blanches	1	50
Bessarabicus Brh.	—	50
ericoides L.	—	50
grandiflorus L.	—	50
horizontalis Desf.	—	50
Japonicus Less.	—	50
novæ Angliæ L.	—	50
novæ Belgii L.	—	50
pyrenæus DC	2	50
Salignus Willd.	—	50
tripolium L.	—	50

Les Asters alpinus, amellus, pyrenæus (plante rarissime) et tripolium, sont des plantes basses, propres à garnir les rochers au soleil; ils fleurissent de Mai en Octobre. Les autres espèces sont pour la pleine terre.

Astilbe

rivularis Haw.	1	50

Bonnes plantes pour les lieux humides et ombragés; feuillage ornemental.

Astragalus

1 alopecuroides L.	2	50
2 exscapus L.	1	50
3 Himalayense Hort. Dub.	1	50
4 monspessulanus L.	1	50
5 purpureus Lam.	1	50

Le n° 1 est une belle et rare espèce à tige haute de 50 à 60 c^{m}, portant de longues feuilles composées et des épis de fleurs axillaires d'un beau

Astragalus (*suite*).

jaune d'or; il lui faut le demi-ombre et le rocher ou la pl. t.; les autres sont des plantes exclusivement saxatiles qui exigent le soleil et le rocher. Mai-Août.

Astrantia

bavarica Schulz 1 50
Biebersteinii Trautv. . . . — 50
carinthiaca Hop. 1 50
carniolica Wulf. 1 50
helleborifolia Salisb. . . . 1 —
involucrata Koch. . . . . 1 —
major L. . . . . — 50
minor L. . . . . — 50
neglecta Koch. 1 50
pauciflora Bertol 1 50

Les Astrances sont des plantes bien connues par leur originalité et leur port gracieux. Ce sont des ombellifères curieuses, dont les ombelles sont supportées par une collerette qui en fait toute la valeur. L'A. major, la meilleure de toutes, fleuritde Mai en Août. Toutes recherchent la fraîcheur et le mi-ombre. R. ou pl. terre.

Athamanthe

cretensis L. . . . . . . — 50
Mathioli Wulf. 1 50
vestina Kern. 1 50

Atragene

alpina L. 1 50
» rubra Rgl. 2 50
genuina Rgl. 2 50
Sibirica Fisch. 2 50
Wenderothii Schtdl. . . . 2 50

Superbes Clématites à fleurs bleues, très rares dans les cultures où elles ne demandent cependant que peu de soins. Mi-s.; r. au pl. t.

Aubrietia

deltoidea DC. . . . . . . — 50
Hendersonni Hort. . . . . — 50
tauricola Boiss. . . . . . — 50

Azalea procumbens L. (Loiseleuria procumbens Desv.) . . 2 50

Charmant et minuscule arbuste des Hautes Alpes, à peine haut de 3 à 5 millimètres, à rameaux couchés sur le sol, garnis de petites feuilles ovales et luisantes, et se couvrant, de Mai à Juin, d'une profusion de fleurs rose vif. Terre de bruyère; r.; s.

Baptisia

australis R. Br. Pl. t. . . . — 50

Bartsia

alpina L. . . . . 1 —

Bellidiastrum

Micheli Cass. . . . . . . — 50

Bellis

cœrulescens Hook (Pâquer^te^ bleue) — 50
rotundifolia Boiss. et Reut. — 50
sylvestris Cyr. . . . . . 1 —

Bellium

bellioides L. . . . . . . — 50

Betonica

alopecuros L. . . . . . . — 50
grandiflora Stev. . . . . — 50

Belle plante caucasienne.

hirsuta L. . . . . — 50
incana Ait . . . . — 50
nivea Stev. . . . . . . — 50
officinalis L. . . . . . . — 50
orientalis L. . . . . . . — 50
stricta Ait. . . . . . . — 50

Les Bétoines sont des Labiées à fleurs roses, lilas, violettes ou blanches, bonnes à placer dans les rochers, au soleil ou à mi-soleil, dans les plates-bandes ou les pelouses. Elles s'élèvent de 20 à 60 c^m^.

Betula

nana L. 2 50

Charmant Bouleau nain des tourbières du Jura. Cet intéressant arbrisseau est devenu très rare, il est l'une des plus jolies décorations des rocailles, ne s'élève pas au-dessus de 80 c^m^, et son feuillage est des plus gracieux.

Biebersteinia

orphanides Boiss. 1 50

Curieuse Géraniacée orientale à racine tuberculeuse, à feuillage finement découpé, à fleurs d'un rose vif. R. ou pl. t.; s.

Biscutella

lævigata L. . . . . — 50

Blechnum (Voy. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Bletilla (Idem).

Boltonia

lævigata Hort. . . . . . — 50
glastifolia Hérit. . . . . — 50

Plantes élevées de la famille des Composées, à tiges dressées, hautes de 1 à 3 mètres, portant, d'Août en Oc-

Boltonia (*suite*).
tobre, une infinité de marguerites d'un rose lilas.

Borago
Orientalis L. . . . . . . — 50
Fleurs bleues; Mars-Avril.

Botrychium (Voy. Foug. et Orchid. rust.).

Brassica
repanda DC. 2 50

Braya
alpina Sternb. . . . . . . — 50
pinnatifida Koch. . . . . . — 50

Bryonia
alba L. . . . . — 50
divisa L. . . . . — 50
Plantes grimpantes à fruits rouges.

Bulbocodium
ruthenicum Bunge 1 50
soboliferum Fisch. et Mey. . 1 50
vernum L. . . . . — 50
Voisines des Colchiques d'automne.

Buphtalmum
grandiflorum . . . . . . — 50
salicifolium L. . . . . . — 50
sylphioides Horn. . . . . — 50
Plantes vivaces de la famille des Composées; fleurs jaunes; 20-25 cm. Pl. t. ou r.; mi-s. Juillet-Septembre.

Butomus
umbellatus L. 2 50
Une des meilleures plantes aquatiques.

Cacalia
hastata L. . . . . — 50

Caccinia
glauca Savi. . . . . . . — 50
Curieuse Boraginée à grands rameaux traînants et chargés d'un feuillage ornemental; fleurs bleues en grappes. Grandes rocailles, plates-bandes; s.

Calamintha
alpina Lam. . . . . . . — 50
grandiflora Mœnch. . . . . — 50
umbrosa Reich. . . . . . — 50

Calla
palustris L. 2 50
Plante aquatique rare et intéressante.

Callirhoë
involucrata A. Gray. . . . . 1 —
pedata A. Gray . . . . . 1 —
Belles Malvacées américaines à grandes fleurs pourpres. R. ou pl. t.; s.

Caltha
biflora DC 1 50
palustris L. . . . . — 50
» à fleurs doubles . . . — 50
parnassifolia Rafin. 2 50
purpurascens Hort. 2 50
Les Populages sont d'entre les bonnes bonnes plantes marécageuses; ils vont également bien dans les rochers à l'humidité, à mi-ombre ou dans les pelouses humides, et même en plates-bandes. Mai-Juin.

Calystegia
dahurica Fisch. . . . . . . — 50
Liseron vivace grimpant à grandes fleurs roses; pl. t.; s. (envahissant).
pubescens Lindl. . . . . . — 50

Calopogon (Voir Catalogue Foug. et Orch. rustiq.)

Calypso (idem).

Camassia esculenta Lindl. . 1 —
C'est une Paradisie à fleurs lilas foncé avec des anthères d'or; pl. vivace d'une grande beauté, très propre également à égayer les rochers.

Campanula
1 Abietina Griseb. . . . . . 1 —
2 Allionii Vill. 2 50
3 alpina Jacq. 1 50
4 Americana L. . . . . . — 50
5 azurea Sol. . . . . . . — 50
6 barbata L. . . . . . . — 50
7 — à fleurs blanches . 1 50
8 Baumgarteni Beck. . . . — 50
9 Bononiensis L. . . . . . — 50
10 cæspitosa Scop. 1 50
11 carnica Schied. 1 50
12 carpatica Jacq. . . . . — 50
13 — à fleurs blanches . — 50
14 celtidifolia Boiss. . . . — 50
15 cenisia L. 2 50
16 collina Bieb. . . . . . — 50
17 dahurica Hort. . . . . — 50
18 Elatines L. 1 50
19 elegans R. S. . . . . . — 50
20 eriocarpa Bieb. . . . . — 50
21 excisa Schleich. 2 50
22 fragilis Cyr. 1 50
23 garganica Ten. . . . . — 70
24 grandis Fisch. . . . . — 50
25 Hendersonii Hort. . . . 1 50
26 Hostii Baumg. . . . . . — 50
27 lactiflora M. B. . . . . — 50

Campanula (*suite*).

28 lamiifolia Bieb. . . . . — 50
29 latiloba DC. 1 50
30 latifolia L. . . . . . . — 50
31 linifolia L. 1 50
32 macrantha Fisch. . . . — 50
33 muralis Portensch. . . . 1 —
34 nobilis Lindl. . . . . . — 50
35 pelviformis Lam. 2 50
36 primulœfolia Brot. . . . — 50
37 pulla L. . . . . 1 —
38 punctata Lam. . . . . . — 50
39 pusilla Hænk. . . . . . — 50
40 — à fleurs blanches. . — 50
41 pyramidalis L. . . . . . — 50
42 — à fleurs blanches . — 50
43 Raineri Perp. 2 50
44 Rapunculus L. . . . . . — 50
45 rhomboidalis L. . . . . — 50
46 — à fleurs blanches . — 50
47 rotundifolia L. . . . . . — 50
48 — à fleurs blanches . . 1 —
49 sarmatica Ker. . . . . . — 50
50 Scheuchzeri Vill. 1 50
51 sibirica L. . . . . — 50
52 speciosa Pour. 1 50
53 spicata L. . . . . — 50
54 Trachelium L. . . . . . — 50
55 thyrsoidæa L. . . . . . — 50
56 turbinata Schott. . . . — 50
57 — à fleurs blanches . 1 —
58 Vanneri Roch. 1 50
59 Valdensis All. . . . . . — 50
60 Waldsteiniana R. S. . . . 2 50
61 Zoysii Wulf. . . . . . . 5 —

Les nos 4, 5, 9, 14, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 53 et 54, sont des plantes vivaces de plus ou moins grandes dimensions, qui font bien en plates-bandes et dans les grands rochers ; la plupart sont de bonnes fleurs à bouquets. Les nos 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 sont des pl. de montagnes a port bas, à fleurs bleues ou blanches, jaunes dans le n° 55, plus ou moins touffues et très propres à garnir les rochers en plein soleil ; les nos 12, 13, 33, 35, 37, 39, 40, 56 et 57, forment d'excellentes bordures. Les nos 2, 18, 21, 22, 23, 33, 43 et 61 sont des plantes saxatiles, murales ou appartenant aux zones les plus élevées des Alpes ; une fente de rocher ou une niche bien drainée en plein soleil, leur convient admirablement ; le n° 18 fait admirablement dans un mur à mi-ombre ; les nos 15 et 61 aiment une niche garnie de cailloux et bien drainée.

Les Campanules fleurissent de mai en août et même plus tard suivant les espèces.

Camphorosma

monspeliaca L. . . . . . . 1 —

Camptosorus (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Cardamine

asarifolia L. . . . . . . 1 —
gelida Schott. . . . . . . — 50
latifolia Vahl. . . . . . . 1 —
Olympica Boiss. . . . . . — 50
pratensis L. à fl. doubles. . — 50
resedifolia L. . . . . . . — 50
trifolia L. . . . . — 50

Carlina

acanthifolia All. . . . . . 1 —
acaulis L. . . . . 1 —

Ce sont de sup. chardons à ligules d'argent dont les têtes brillantes atteignent parfois 40 cm. de diamètre chez acanthifolia, et qui sont d'un grand effet décoratif. On conserve parfois, comme les immortelles, leurs belles fleurs qu'on nomme chardon d'argent. C'est l'un des plus beaux ornements des rocailles ou des pelouses l'automne, d'août en octobre, soleil ; sol profond.

Cephalantera (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Centaurea

alpina L. 1 50
argentea L. . . . . 1 —
atropurpurea W. et K. . . . — 50
Babylonica L. 1 50
calocephala Willd. . . . . — 50
cineraria L. . . . . — 50
dealbata Willd. . . . . . — 50
gynmocarpa Moris. . . . . — 50
hybrida All. . . . . — 50
Lugdunensis Jord. . . . . — 50
macrocephala Muss. . . . 1 —
montana L. . . . . — 50
— à fleurs blanches. . 1 —
nervosa Willd. . . . . . . — 50
orientalis L. . . . . . . 1 —
Phrygia L. . . . . — 50
Ruthenica Lam. . . . . . — 50
rutæfolia Sib. . . . . . . — 50

Centaurea (*suite*).

Sadleriana Jank. . . . . — 50
spinulosa Roch. . . . . — 50
uniflora All. 1 50

Les Centaurées sont de bonnes plantes vivaces, très robustes et florifères ; les C. Babylonica (très élevée et atteignant parfois 2 m. 1/2 de haut), orientalis et macrocephala possèdent de belles fleurs jaune vif, très grandes chez cette dernière; on les nomme bluets jaunes; la C. alpina, d'un jaune clair, est une pl. rare et très élégante. Les autres sont bleues, rose, pourpre, blanches où jaunâtres suivant l'espèce; toutes sont d'excellentes plantes vivaces pour la plate-bande ou les grands rochers ; elles préfèrent le soleil et se contentent de tout bon sol sain.

Centranthus

angustifolius DC. . . . . . — 50
ruber DC. . . . . — 50
— à fleurs roses. . . . . — 50
— à fleurs blanches. . — 50

Ce sont des Valérianes très propres à garnir les rocailles ou les vieilles murailles et qui font également admirablement dans les plates-bandes. Elles fleurissent depuis le mois de mai jusqu'en automne. Excellentes pour la fleur à couper.

Cephalaria

alpina Schrad. . . . . . — 50
ambrosioides R. S. . . . . — 50
centaurioides R. S. . . . — 50
leucantha R. S. . . . . . — 50
radiata Schult. . . . . . — 50
tatarica R. S. . . . . . — 50
Uralensis R. S. . . . . . — 50

Grandes Scabieuses à fleurs d'un jaune plus ou moins ocreux et atteignant, suivant les espèces, près de 3 mètres de haut, La C. alpina est la meilleure et fleurit pendant tout l'été. P. t. ou grands rochers. Plantes aux formes architecturales.

Cerastium

alpinum L. . . . . — 50
Boissieri Gren. . . . . . — 50
dahuricum Fisch. . . . . — 50
decalvans Schloss et Vuk. 1 50
glaciale Gaud. . . . . . 1 —
Illiricum Ard. . . . . . 1 —
Pennsylvanicum Horn. . . — 50
tomentosum L. . . . . . — 50
villosum Baumg. 1 50

Plantes naines et touffues, propres à garnir les rochers en plein soleil ou former des bordures ; fl. blanches, feuillage plus ou moins tomenteux.

Cerinthe

alpina Kit. . . . . — 50

Ceterach (Voir Catalogue Foug. et Orchid. rust.)

Chamæcerasus

Alberti Rgl. (Lonicera) . 1 50

Chamæmelon

caucasicum Willd. . . . . — 50
discoideum Boiss. . . . . — 50
Pichleri Boiss. . . . . . — 50
Tschihatchevii Boiss. (Pyrethrum Tsch.) . . . . . — 50

Ce sont des chamomilles inodores à grandes fleurs et à feuillage plus ou moins finement divisé, très propres à former des gazons ou des bordures.

Chamæorchis (Voir au Cat. Foug. et Orch. rust.)

Chamæpeuce nivea DC. . . . 2 50

Cheiranthus

alpinus L. 1 50
Cheiri L. . . . . — 50

Chelidonium

grandiflorum DC. . . . . — 50
laciniatum Mill. . . . . — 50

Cheilanthes (Voir catalog. Foug. et Orchid. rust.)

Cherleria sedoides L. . . . . — 50

Chionodoxa

Forbesi Bak. . . . . . . — 50
Luciliæ Boiss. . . . . . — 50
Sardensis Barr. et Sugd. . 1 —

Délicieuses Liliacées orientales ressemblant à des Scilles, d'un bleu très vif et fleurissant en mars. Soleil.

Chrysanthemum

alpinum L. (Leucanthemum alp.) . 1 —
arcticum L. . . . . — 50
ceratophylloides All. . . — 50
chloroticum Mumb. . . . — 50
cinerariæfolium Vis. . . . — 50
corymbosum L. . . . . . — 50
coronopifolium Vill. . . . — 50
grandiflorum Lap. . . . . — 50
heterophyllum Willd. . . — 50
lacustre Brot. . . . . . 1 —
montanum L. . . . . . . — 50
orjanensis (Belv.) . . . . 1 —
rotundifolium W. K. . . . — 50

Chrysanthemum (*suite*).
Zavadsky Herb. . . . . . — 50
Plantes de pl. t. et de soleil, sauf l'alpinum qui demande la rocaille et le mi-soleil.

Chrysogonum
Virginianum L. 2 50

Chrysoplenium
alternifolium L. . . . . . — 50
glaciale Fuss. . . . . . . — 50
oppositifolium L. . . . . — 50
rosulare S. N. K. . . . . . — 50
Plantes de la famille des saxifrages, à fleurs d'un jaune verdâtre et très propres à garnir les lieux humides et ombragés des rocailles.

Cimicifuga
fœtida L. . . . . — 50

Cineraria
aurantiaca Hoppe. . . . 1 50
campestris Retz. . . . 1 50

Circæa
alpina L. . . . . — 50
Lutetiana L. . . . . . — 50

Cirsium
acaule All. . . . . — 50
Eriophorum Scop. . . . . — 50
flavissimum Boiss. . . . — 50
heterophyllum All. . . . — 50
Rhizocephalum C. A. M. . — 50

Claytonia
perfoliata Don. . . . . . — 50
Sibirica L. . . . . — 50

Clematis
alpina Lam. (Voir Atragene).
angustifolia Jacq. . . . . 1 —
Bonariensis Juss. . . . . 1 —
campaniflora Brot. . . . 1 —
caracassana DC. . . . . 1 —
cirrhosa L. 1 50
coccinea Engelm (à fl. rouge vif) 2 50
corymbosa Poir. . . . . . 1 —
crispa L. 1 50
cylindrica Sims. . . . . . 1 —
Davidiana Dcsne, ... 1 —
diversifolia DC. . . . . . 1 —
erecta All. . . . . — 50
flammula L. . . . . — 50
florida Thunb. . . . . . 1 —
fragans Ten. . . . . . . 1 —
fusca Turcz. . . . . . . 1 —
Gebleriana Bong. . . . 1 50

Clematis (*suite*).
glauca Willd. (à fl. jaunes). 1 —
grata Wall. 2 50
graveolens Willd. (à fl. jaunes). 1 —
Hendersonni Hort. . . . 1 —
hybrida Jard. alp. . . . 2 50
Pl. non grimpante, superbe, très propre à garnir les grands rochers; fleurs en panicules, de couleur bleu azuré (nouveauté obtenue ici).
integrifolia L. . . . . . . 1 —
jubata Bich. . . . . . . 1 —
lathyrifolia Bess. . . . . 1 —
macropetala Led. . . . . 1 —
Mandschurica Rupr. . . 2 50
montana Buch. . . . . . 1 —
L'une des plus vigoureuses; fl. blanches très nombreuses et odorantes.
Pallasii Gmel. 1 50
paniculata Thumb. . . . 1 —
recta L. (V. erecta). . . 1 —
Sargentii Laval. 2 50
Sibirica Mill. (V. Atragene).
terniflora DC. 2 50
tubulosa Turcz . . . . . 1 —
verticillaris DC . . . . . 1 —
virginiana L. . . . . . . 1 —
Vitalba L. . . . . — 50
viticella L. . . . . . . — 50

Clerodendron
fœtidum Don. 1 50
Belle plante vivace, rustique à Genève, à grands panicules roses répandant un parfum très agréable et fleurissant d'Août en Octobre.

Cochlearia
Groenlandica L. . . . . . — 50
saxatilis Lam. (V. Kernera).

Codonopsis (V. Glossocomia).

Cœloglossum (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Colchicum
alpinum DC . . . . 1 —
arenarium W. K. 1 50
autumnale L. . . . . . . — 50
» à fleurs blanches . . 1 50
Bertolonii Stev. 1 50
Bivonæ Guss. 1 50
Bornmülleri Freyn. . . . 5 —
byzantinum Gawl. . . . 2 50
crociflorum Boiss. . . . 2 50
lætum Stev. . . . . . . 1 —
luteum Bak. . . . . . . 5 —

Colchicum (*suite*).

Neapolitanum Ten.	2	50
pannonicum G. et S.	2	50
speciosum Stev.	1	50
variegatum L.	2	50

Les Colchiques font bien dans les rochers ou les gazons; elles aiment un sol ferme et profond, l'humidité plutôt que le sec, et le mi-soleil.

Coluria

geoides R. Br.	—	50

Convallaria

maialis L. (muguet)	—	50
» à fleurs roses	1	—
» à feuilles striées	1	—

Convolvulus

cantabricus L.	1	—
Mauritanicus Boiss.	—	50
Panduratus L. (V. Ipomæa).		
Soldanella L.	1	50
Stans Michx	2	50

Liserons vivaces très florifères et propres à décorer les rochers ou les plates-bandes. S.

Coptis

trifoliata Salisb.	1	50

Jolie petite Renonculacée de l'Amérique du Nord, à feuilles persistantes d'un vert foncé et luisantes.

Corbularia

bulbocodium Haw. Narcissus bulb.	1	—
nivalis Nym.	5	—
obesus Salisb.	1	50

Corchorus

Japonicus L.	1	50

Le type à fleurs simples; rare.

Coreopsis

auriculata L.	—	50
grandiflora Hogg.	1	—
lanceolata L.	—	50
senifolia Mich.	1	50
tenuifolia Ehrh.	1	50
tripteris L.	1	50
verticillata L.	1	—

Bonnes plantes vivaces très recommandables pour les plates-bandes et comme fleurs coupées.

Coriaria

myrtifolia L.	1	50

Coris

monspeliensis L.	1	50

Cornus

canadensis L.	1	50
suecica L.	1	50

Coronilla

cappadocica Boiss.	1	—
Emerus L.	—	50
glauca L.	1	—
Libanotica Boiss.	1	—
montana Scop.	1	—
vaginalis Lam.	—	50
varia L.	—	50

Corrigiola

littoralis L.	—	50

Cortusa

Mathioli L.	—	50
» grandiflora	—	50
pubens S. N. K.	1	50
villosa (Gusmus)	1	50

Les Cortuses sont de charmantes Primulacées à petites fleurs rose carmin vif. R.; ombre et fraîcheur. Avril-Juin.

Corydalis

1 bracteata Pers.	1	50
2 cava Vahl.	—	50
3 glauca Pursh.	—	50
4 Kolpakowskiana Rgl.	2	50
5 Ledebouri	1	50
6 lutea DC.	—	50
7 nobilis Pers.	1	50
8 ochroleuca Koch	—	50
9 pallida Pers.	1	—
10 racemosa Pers.	1	—
11 Semenowi Rgl.	2	50
12 Sewerzowi Rgl.	2	50

Charmantes plantes au feuillage finement découpé, à la fleur délicate; les n°s 1, 2, 4, 5, 7, 11 et 12 sont des pl. à racines fortes et souvent tubéreuses; les autres sont saxatiles et font merveille dans les vieux murs ou les fentes des rochers. Les n°s 1, 4, 5, 7, 8, 11 et 12 sont des plantes élevées de 15 à 50 c^m, à fl. jaune clair ou blanches; le n° 6, à fl. d'un jaune d'or, qui se succèdent tout l'été sur la plante, ne s'élève pas à plus de 15 à 20 c^m; les n°s 2, 3, 9 et 10 sont à fleurs roses. R. ou pl. t.; s.

Cotoneaster

acuminata Lindl. . . . . 1 —
affinis Lindl. . . . . . 1 —
bacillaris Wall. . . . . 1 —
buxifolia Wall. . . . . 1 —
Fontanesii Spach. . . . 1 —
frigida Wall. . . . . . 1 —
horizontalis Dcsne. . . . 1 —
lucida Schl. . . . . . . 1 —
microphylla Wall. . . . 1 —
rupestris Lindl. . . . . 1 —
Simonsii Bak. . . . . . 1 —
tomentosa Lindl. . . . . 1 —
vulgaris Lindl. . . . . 1 —

Excellents arbustes bas, souvent traînants et saxatiles, propres à garnir les rocailles et à leur donner un cachet naturel et artistique. Baies rouges parfois très nombreuses. S.

Crambe

cordifolia Stev. 1 50

Crepis

aurea Cass. . . . . . . — 50
grandiflora Tausch. . . . — 50
jubata Koch. 2 50
pygmæa L. . . . . 1 —
sibirica L. . . . . — 50

Crocus

adriaticus Herb. . . . . . — 50
aureus Sib. et Sm. . . . . — 50
Ancyrensis Maw. . . . . — 50
biflorus Mill. . . . . . . — 50
Boryi Gay. . . . . — 50
cilicicus Kotschy . . . . — 50
Imperati Ten. . . . . . — 50
iridiflorus Heuf. . . . . . 1 —
Kotschyanus Koch. . . . — 50
lævigatus Bory. . . . . . — 50
luteus Lam. . . . . . . — 50
Mazziaricus Herb. . . . . — 50
micranthus Boiss. . . . . — 50
pulchellus Herb. . . . . . — 50
speciosus Bieb. . . . . . — 50
Suzianus Ker. . . . . . . — 50
variegatus Hoppe. . . . . — 50
vernus Smith. . . . . . . — 50

Crucianella

stylosa Trin. . . . . . . — 50

Excellente pl. à rocailles, naine et rampante, propre à former des bordures et des gazons; elle produit, de Juin en Septembre, des grappes de fleurs d'un rose chair qui sont fort jolies; s. ou o.

Cryptograme (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Crythmum

maritimum L. 1 50

Cyclamen

Coum Mill 1 50

Charmante espèce grecque à fleurs rose vif, très précoce.

europaeum L. . . . . . . — 50
» à fl. blanches 1 50

Le Cyclamen d'Europe à fleurs odorantes et apparaissant l'automne, demande l'ombre et un sol calcaire.

græcum Link 2 50
hederæfolium Ait. . . . . 1 —
» à fl. blanches 1 50

Le C. à feuilles de lierre est une fort belle espèce automnale à fleurs rose clair, inodore.

repandum Sib. Sm. 1 50

Il se rapproche de l'espèce précédente mais fleurit au printemps.

vernum Reich. 2 50

Cypripedium (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Cystopteris (Idem.).

Cytisus

albus Link. . . . . 1 —
alpinus Mill . . . . 1 —
austriacus L. . . . . . . 1 —
capitatus Jacq. . . . . . . 1 —

Charmant petit arbuste se couvrant de fleurs jaune d'or pendant les mois de Mai et Juin.

hirsutus L. . . . . 1 —
Laburnum L. . . . . . . — 50
purpureus Scop. 1 50
Ruthenicus W. et Kit. . . 1 50
Uralensis Ledeb. 1 50
Veldeni Vis. 1 50

Dalibarda

repens L. 1 50

Plante rampante voisine des Dryas, originaire de l'Amérique septentr.

Daphne

1 alpina L. 1 50
2 Blagayana Freyn. . . . 1 50
3 collina Sm. 1 50

Daphne *(suite)*.

4	Cneorum L. (Thymélée des Alpes)	2 50
5	» forts exemplaires	5 —
6	Laureola L.	1 50
7	Mezereum L. (Bois-gentil)	1 50
8	» à fl. blanches	5 —
9	Petræa Leyb	2 50
10	Philippi Gren.	2 50
11	striata Tratt.	2 50
12	Verloti Gren. et God.	2 50

Les Daphne sont d'entre les meilleures et les plus délicieuses des fleurs de montagnes; ils sont très propres à l'ornementation des rocailles et même des plates-bandes. Le Thymélée des Alpes s'utilise de toutes manières dans les jardins qu'il anime de ses superbes fleurs roses au parfum pénétrant, apparaissant Mai-Juin. Il refleurit souvent à l'automne. C'est, avec les Rhodendrons, le meilleur de nos arbustes alpins. Plein soleil. Les nos 1 et 2 sont des arbustes bas, à fleurs blanches, et demandent la R. et le mi-ombre; 6, 7, 8 et 10 atteignent parfois 1m de haut et demandent l'ombre (ce sont de bonnes plantes de sous-bois); 3 est un arbuste de 50-60 cm, à fleurs violettes très odorantes, mais qui craint les hivers trop rigoureux; il lui faut donc une position abritée; 9, 11 et 12 sont des arbustes nains et traînants, à fleurs d'un rouge plus ou moins vif suivant l'espèce, toujours très odorantes; exigent la R. et le s. Presque tous les D. fleurissent de mars en Juin.

Delphinium

alpinum W. K.	— 50
altissimum Wall.	— 50
amœnum Stev.	— 50
Brunonis	1 50
Cashmerianum Royle	1 50
Caucasicum C. A. M.	— 50
Chinense Fisch	— 50
cœleste Michx	— 50
cœrulescens Wendr	— 50
crassicaule Gmel.	— 50
crassifolium Schrad.	— 50
cyaneum Stev.	— 50
elatum L.	— 50
fissum W. et K.	— 50
flexuosum Bieb.	— 50
formosum Hort.	— 50
grandiflorum L.	— 50
hybridum Steph.	— 50

Delphidium *(suite)*.

intermedium Ait.	— 50
laxiflorum DC	— 50
laxum Mill.	— 50
Maackianum Rgl.	— 50
magnificum Paxt.	— 50
neglectum Fries.	— 50
nudicaule Torr. et Gray	1 50
orientale Gay	— 50
palmatifidum DC	— 50
puniceum Pall.	— 50
Przewaldskyi Rgl	— 50
Requieni DC.	— 50
spurium Fisch.	— 50
staphysagria L.	— 50
Szowitzianum Rgl.	— 50
tricorne Michx.	— 50
triste Fisch.	— 50
Turkestanicum Rgl.	— 50
vestitum Wall.	— 50
Wheeleri Lam.	— 50
Zalil Aitch	2 50

Les Pieds d'Alouettes ou Dauphinelles sont d'entre les meilleures plantes vivaces pour les plates-bandes ou les parterres. La plupart portent des fleurs généralement d'un bleu intense et parfois d'azur, et sont des plantes très élevées (25 cm à 2 m.). Le D. nudicaule, des montagnes de l'Amérique centrale, est une espèce basse, à fleurs d'un rouge vermillon; il lui faut le sec et le mi-soleil. Le D. Zalil, de l'Afghanistan, est une belle plante à fleurs jaune soufre, bonne pour les rochers, et qu'il faut tenir au sec l'hiver.

Toutes sont de bonnes plantes à bouquets et précieuses pour l'ornementation des jardins.

Dentaria

bulbifera L.	1 50
digitata Lam.	— 50
diphylla Mich.	1 50
enneaphylla L.	1 50
glandulosa W. K.	2 50
intermedia Soud.	1 50
Kiliasi Brugger	2 50
pinnata Lam.	— 50
polyphylla W. K.	1 50

Bonnes plantes pour les sous-bois ou les endroits frais et ombragés des rocailles.

Dianthus

alpestris Balb	—	50
alpinus L.	—	50
ambiguus Panc.	—	50
arenarius L.	—	50
aridus Janka	1	50
armeria L.	—	50
asper L.	—	50
atrorubens All.	—	50
attenuatus Smith	—	50
Balbisii Ser.	—	50
Bannaticus Heuf.	—	50
bicolor Bieb.	—	50
Britanicus Bieb.	—	50
cæsius Smith	—	50
callizonus S. et K.	2	50
calocephalus Boiss.	—	50
campestris Bieb.	—	50
capitatus DC.	—	50
carthusianorum L.	—	50
caryophyllus L.	—	50
cinabarinus Sprün.	1	50
Corsicus Fisch.	—	50
courtoisii Reich.	—	50
cruentus Griseb.	—	50
» parviflorus Panc.	—	50
deltoides L.	—	50
dentosus Fisch.	—	50
fimbriatus Bieb.	—	50
fragrans Herb.	—	50
furcatus Balb.	—	50
gallicus Pers.	—	50
giganteiformis Borb.	—	50
giganteus D'Urv.	—	50
glacialis Hænk.	1	50
» nitidus.	2	50
glaucophyllus Horn.	—	50
Heptaneurus Gris.	—	50
Hungaricus Heuf.	—	50
Japonicus Thumb.	—	50
Knappii Asch.	1	50
Liburnicus Bartl.	—	50
marsicus Ten.	—	50
monspessulanus L.	—	50
montanus Bieb.	—	50
nardiformis Janka	—	50
neglectus Lois.	1	50
nitidus W. et K.	2	50
papillonus Vis. et Panc.	1	50
parnassicus Boiss.	1	50
parviflorus Schur.	—	50
pelviformis Heuff.	—	50

Dianthus *(suite)*.

petraeus W. et K.	—	50
Plumarius L.	—	50
Pontederae Kern.	—	50
pratensis Bieb.	—	50
pulchellus Reich.	—	50
Requieni G. et G.	1	—
rupicola Biv.	1	—
sanguineus Vis.	—	50
Scheuchzeri Reich.	—	50
Seguieri Vill.	—	50
spiculifolius Schür.	—	50
squarrosus Bieb.	—	50
subacaulis Schur.	2	50
superbus L.	—	50
sylvestris Wulf.	—	50
tener Balb.	—	50
tenuiflorus Griseb.	—	50
tenuifolius Schur.	—	50
Thymphresteus Heldr.	—	50
trifasciculatus Kit.	—	50
versicolor Fisch.	—	50
virgineus Gr. et Godr.	—	50
viscidus Bor.	—	50
vulturius Guss.	—	50

Les D. alpinus, cæsius, callizonus, glacialis, nitidus et neglectus sont des plantes de la haute montagne qui exigent la rocaille et le mi-soleil ; ce sont des plantes basses, cespiteuses, qui se recouvrent, en Mai-Juin, de grandes fleurs plus ou moins acaules, d'un rose plus ou moins vif suivant l'espèce; ils sont l'un des plus beaux ornements des rocailles, et de culture facile. Le D. cinabarinus, d'un rouge cinabre, est l'un des plus curieux, et les D. Knappii et aridus, avec leurs petites fleurs d'un jaune soufre clair, sont également remarquables. Le D. superbus, bien connu par l'abondance de ses gracieuses et très odorantes fleurs lilas, élégamment laciniées, est l'un des plus précieux ornements de nos rochers ombragés et de nos sous-bois, d'Août en Octobre. La plupart des autres espèces sont d'un rose plus ou moins franc, odorantes ou non, et à fleurs plus ou moins grandes. Toutes sont excellentes pour la garniture des rochers en plein soleil et ont l'avantage de fleurir longtemps et pendant une époque de l'année (Juin-Août) où la flore alpine a passé. La grande généralité de ces Œillets sont l'une des plus précieuses ressources pour l'ornementation des rocailles, plates-

bandes ou talus. Culture aisée et floraison abondante; presque toujours parfum délicat.

Dicentra

canadensis DC . . . . .
cucullaria DC . . . .

Pl. d'ombre, très voisines des Diclythra; feuillage fin; r.

Dictamnus

albus L. . . . . 1 —
angustifolius Sw. . . . 2 50
Fraxinella L. . . . . . 1 —
Hymalaicus Royle . . . 2 50
obtusifolius 2 50
purpureus Hort. . . . 1 —

Bonnes plantes vivaces bien connues par leurs glandes résineuses qui exhalent un gaz inflammable; belles grandes fleurs roses ou blanches, en grappes dressées. Mai-Juin. Pl. t.; s.

Dyclithra

eximia DC . . . . . . — 50
formosa DC . . . . . 1 —
spectabilis DC . . . . — 50

Bonnes plantes vivaces; la dernière, très connue, est d'assez grande taille, les autres plus fines et plus basses; pl. t.; mi-s.

Digitalis.

ciliata Trautv. 1 50
grandiflora Lam. . . . . — 50
lanata Ehrh. . . . . . 1 —
lutea L. . . . . — 50
purpurea L. . . . . . . — 50
» variétés . . . . — 50
sibirica Lindl. . . . . . — 50

Bonnes plantes de rocailles ou de pl. t.; le D. grandiflora (fleurs jaunes), est l'un des précieux ornements des roc. en Juillet-Août; mi-o.

Dioscorea

bulbifera L. . . . . . . — 50
sp. Caucase . . . . . 5 —

Diplopappus

umbellatus Hook. . . . 1 —

Dipsacus

asper Wall. . . . . . . — 50

Dodecatheon

integrifolium Michx. . . 1 —
Jeffreyi Hort. . . . . 1 —

Dodecatheon (*suite*).

Mædia L. . . . . 1 —
» à fleurs blanches . . 1 —

Les Gyroselles, ou Herbe aux douze dieux, sont de charmantes Primulacées de l'Amérique du Nord dont les fleurs ont quelque rapport avec celles des Cyclamens et forment un bouquet multiflore au sommet des tiges nues et hautes de 10-50 cm suivant les espèces. Avril-Juin; sol léger, frais; r.; mi-s.

Doronicum

austriacum Willd. . . . — 50
caucasicum Bieb. . . . . — 50
Carpetanum Boiss. . . . — 50
Columnæ Ten. . . . . . — 50
Draytonense Hort. . . . 1 —
Hungaricum Reich. . . . 1 50
macrophyllum Bernh. . . — 50
Pardalianches L. . . . . — 50
Scorpioides Willd. . . . — 50

Belles Marguerites jaunes très décoratives; r. ou pl. t.; mi-s.

Draba

aizoides L. . . . . . . — 50
aizoon Hoppe . . . . . — 50
alpina L. . . . . — 50
altaica Bunge. . . . . — 50
arabisans Michx. . . . . — 50
armata Schott . . . . . — 50
aurea Vahl. . . . . . . — 50
borealis DC . . . . . . — 50
bruniæfolia Stew. . . . — 50
carinthiaca Hoppe. . . . — 50
ciliata Scop. . . . . . — 50
contorta Ehr. . . . . . — 50
cuspidata Bieb. . . . . — 50
elongata Host. . . . . — 50
fladnizensis Willd. . . . — 50
frigida Sauter . . . . . — 50
Gmelini Adans. . . . . — 50
Gygas Stur. . . . . . . — 50
Hainaldi Stur. . . . . . — 50
Hirta Jacq. . . . . . . — 50
Hoppeana Reichb. . . . — 50
incana L. . . . . — 50
Johannis Host. . . . . — 50
Kotschy Stur. . . . . . — 50
lactea Adans. . . . . . — 50
lapponica Willd. . . . . — 50
lasiocarpa Rochel. . . . — 50

Draba (*suite*).

nemorosa L. . . . . — 50
pyrenaica L. (Petrocallis). . . 1 50
Olympica Sibt. . . . . . . — 50
Sauteri Hoppe. . . . . . . — 50
scabra C. A. M. 1 50
Scandinavica Lind. . . . . — 50
stellata Jacq.. . . . . . — 50
tomentosa Wahl. . . . . . — 50
tridentata DC . . . . . . 1 —
turgida Huet. . . . . . — 50
Wahlenbergi Wartm. . . . — 50
Zahlbrückneri Hort. . . . — 50

Les Draves sont de petites Crucifères formant des touffes serrées et compactes; fleurs petites en grappes généralement dressées, à corolle jaune ou blanche suivant l'espèce, et fleurissant toutes de bonne heure au printemps. Elles sont tout particulièrement appropriées aux rocailles où elles réussissent entre les fentes des rochers au soleil, ou dans de petites niches, car il leur faut peu de nourriture.

Dracocephalum

1 argunense Fisch. . . . . . — 50
2 austriacum L. . . . . . . — 50
3 Japonicum Gray. . . . . 1 —
4 moldavica L. . . . . . . — 50
5 nutans Fisch . . . . . . — 50
6 » var. alpinum Rgl. . . 1 —
7 parviflorum Nutt. . . . . — 50
8 peregrinum L. . . . . . — 50
9 Ruyschiana L. . . . . . — 50
10 Ruprechti 1 50
11 speciosum Bent. . . . . 1 —

Plantes voisines des Sauges, à fleurs bleues, hautes de 30-40 cm; les nos 5 et 6 forment de gracieuses touffes serrées et naines, portant de belles grappes de fleurs d'un bleu intense. Nos 1, 2, 3, 4, 9 et 11, sont de belles touffes à fl. bleu plus clair, no 10 est une superbe nouveauté parmi les plus vivaces. Toutes sont excellentes pour les rochers et la pl. t.; leurs fleurs sont une bonne ressource pour la confection des bouquets; s. ou mi-s. Mai-Juillet.

Dryas

Drummondi Rich. . . . . 1 —
lanata Kern. 2 50
octopetala L. . . . . . . — 50
tenella Pursh. 2 50

La Dryade est l'une des plus gracieuses d'entre les plantes de rocailles; elle réunit à un feuillage élégant une belle fleur d'églantine blanche, et forme de larges tapis extrêmement décoratifs. Le D. Drummondi, de l'Amérique septentrion., a des fleurs jaunes penchées, et le D. lanata un feuillage velu. R.; on en peut aussi constituer des bordures de plates-bandes. Mai-Juin.

Drypis spinosa L. . . . . . . — 50

Echinacea

angustifolia DC . . . . . 1 —
purpurea Moench. . . . . 1 —
serotina DC . . . . 1 —

Ce sont de superbes plantes vivaces de la famille des Composées, très voisines des Rudbeckia, à fleurs rouge brun, entourées de grandes ligules pendantes. Pl. t.; s. Juillet-Août.

Echinops

Bannaticus Rochel . . . . — 50
dahuricus Fisch. . . . . . — 50
humilis Bieb. . . . . . . — 50
Ritro L. . . . . — 50
saxatile Scop. . . . . . . — 50
sphaerocephalus L. . . . . — 50

C'est un genre de Chardons bleus à capitules de fleurs en boules et sphériques, bleu tendre ou foncé suivant l'espèce, de taille plus ou moins élevée, et très propres à garnir les plates-bandes ou à orner les grands rochers ou le jardin pittoresque et sauvage; excellentes pour la fleur coupée. Juillet-Août.

Echium

petraeum Tratt. (Lithorpermum petr.) . . 1 —

Très joli petit arbuste de la famille des Boraginées, se couvrant, de Mai à Juillet, de fleurs d'un bleu d'azur avec teintes purpurescentes. R.; s.

Edelweiss (V. Gnaphalium).

Edrayanthus ou **Hedraeanthus**

caricinus Schott. 2 50
croaticus Kern. 2 50
dalmaticus DC . . . . . . 1 —
Dinaricus Kern. (Pumiliorum) . 2 50
graminifolius DC 2 50
pumilio DC 1 50
serpyllifolius DC 2 50
tenuifolius DC 1 50

Charmantes plantes naines, très voisines des Campanules, à fl. lilas ou violet foncé, formant des touffes éta-

lées sur le sol et fleurissant de Mai en Juillet. R.; s.; elles font également bien dans les fentes des vieilles murailles.

Empetrum

nigrum L. 1 50

Joli petit arbuste alpin à petites feuilles persistantes d'un vert foncé luisant, et portant de petites fleurs rougeâtres auxquelles succèdent des baies d'un noir de jais. R.; o. ou mi-o.

Elymus

arenarius L. . . . . — 50

Grande graminée ornementale à feuillage glauque presque bleu.

Ephedra

altissima Desf. 1 50
andina Poepp. 1 50
Helvetica C. A. M. 2 50
monostachya L. 1 50
Sikkimensis Hort. 2 50

Curieux petits arbustes saxatiles, voisins des Conifères et offrant l'aspect des Prêles, à placer dans les rochers en plein soleil.

Epigæa

repens L.. . . . . 1 50

Epilobium

abyssinicum Hochst. . . — 50
alpinum L. . . . . — 50
angustifolium L. . . . . — 50
Dodonaï Vill. . . . . . — 50
glabellum Forst. . . . . — 50
luteum Pursh. 2 50
pedunculare Cun. . . . . 1 —
rosmarinifolium Haenk. . . — 50

Epimedium

1 alpinum L. . . . . . . — 50
2 colchicum Hort. . . . . 1 —
3 diphyllum Lodd. . . . . 1 —
4 discolor Hort. . . . . . 1 —
5 lilacinum Marck. . . . . 1 —
6 macranthum Lindl. . . . 1 50
7 Muschianum Morr. et Dcsn. 1 —
8 » rubrum 1 50
9 niveum Hort. 1 50
10 ochroleucum Dcsn. . . . 1 50
11 pinnatum Fisch. . . . . 1 —
12 purpureum Hort. . . . . 1 —
13 sulfureum Hort. . . . . 1 —
14 violaceum Morr. et Dcsn.. 1 —

Les Epimedium sont d'entre les plus gracieuses et les plus intéressantes des plantes japonaises. Feuillage d'un beau vert, luisant, décoratif; fleurs très gracieuses, fines et intéressantes, très précieuses pour les bouquets; coloris, légèreté, ces plantes ont tout pour plaire. Elles réussissent dans tous les sols et demandent une position légèrement ombragée.

Le n° 1 est une gracieuse espèce stolonifère et envahissante, à fl. roses, à feuillage élégant, très propre à garnir les lieux ombragés ou les sous-bois; n°s 2, 10 et 11 sont de belles plantes à fleurs d'un jaune vif, à feuillage persistant d'un vert foncé luisant, décoratives l'hiver comme l'été, et très utile pour la décoration des rocailles, plates-bandes ou jardins pittoresques; n°s 3, 6 et 9 sont à fleurs blanches; 5 et 14 à fleurs lilas ou violet foncé; 4, à fl. rouge et jaune; 12, à fl. rose pourpre vif. Il y en a de toutes les teintes, formes et couleurs, et rien n'est beau, dans un jardin ou un rocher, comme la collection de tous ces Epimedium. Ils fleurissent tous en Avril-Mai.

Eranthis

yemalis L. . . . . — 50

Hellébore jaune d'hiver.

Eremostachys

Iberica Vis. 1 50
laciniata Bung. 1 50

Deux belles et grandes Labiées vivaces propres à décorer les jardins pittoresques ou les plates-bandes.

Eremurus

altaicus Stev. . . . . . 1 —
robustus Rgl. . . . . . 1 —
spectabilis Bieb.. . . . . 1 —
Turkestanicus Rgl. . . . 2 50

Erica

carnea L.. . . . . 1 —

La bruyère rose des Alpes demande une exposition au soleil et un sol calcaire; elle fleurit souvent pendant tout l'hiver.

Erigeron

alpinus L. . . . . — 50
» var. articus . . . . — 50
armerifolius Turcz. . . . — 50
aurantiacus Rgl. . . . . — 50
» splendens . . . . . — 50
atticum Wahl. . . . . . — 50
Caucasicum Stev. . . . . — 50

Erigeron *(suite)*.

glabellus Nutt. . . . . . — 50
Kamtschaticus DC . . . . — 50
pulchellus DC . . . . . . — 50
Philadelphicum L. . . . . — 50

Excellente plante vivace pour la plate-bande et la fleur coupée.

speciosum DC . . . . . . — 50
uniflorus L. . . . . — 50
Villarsii Bell. . . . . . . — 50

Les Vergerettes sont une sorte de Pâquerette ou de Marguerite à fleurs bleues, rouge vif ou rose, très florifères, et bonne pour l'ornementation des rochers ou plates-bandes.

Erinus

alpinus L. . . . . — 50
» à fl. blanches . . . . 1 —
hirsutus Lap. . . . . . . — 50
hispanicus Pers. . . . . . — 50

Très propres à l'ornementation des rochers ou des murailles au mi-soleil, Mai-Juillet.

Eryophorum

alpinum L. . . . . — 50
capitatum Host. . . . . . — 50
vaginatum L. (Line-Aigrette) . . — 50

Eritrichium

nanun Schrad 2 50

Le beau Myosotis nain des Hautes-Alpes.

Erpetion

reniforme Spach. 1 50
Violette bicolore d'Australie.

Erodium

1 alpinum L'Hérit. 1 50
2 cheilantifolium Boiss. . . . 2 50
3 corsicum DC 1 50
4 daucoides Boiss. 1 50
5 Hymenodes L'Hérit. . . . 1 —
6 macrodenum L'Hérit. . . . 1 —
7 Manescavi Boub. . . . . 1 —
8 Olympicum Boiss. 2 50
9 Reichardii DC 2 50
10 Sibthorpianum Boiss. . . . 2 50

Plantes très voisines des Geranium, extrêmement florifères, et très précieuses pour la garniture des rochers ou plates-bandes en plein soleil; elles fleurissent généralement tout l'été. Les nos 1, 5 et 7 sont des plantes terrestres à fl. d'un rouge purpurin très vif, grandes et très ornementales chez no 7; nos 2, 3, 5 et 6 sont des plantes saxatiles qui se plaisent mieux entre les fentes des pierres que dans la pleine terre, et dont les fleurs sont rose pâle maculées ou striées de brun; nos 8 et 10 sont à fleurs couleur de mauve et fort merveille dans un rocher en plein soleil ou bien dans un vieux mur. Le no 9 est à fleurs blanches et préfère une niche au mi-soleil.

Eryngium

alpinum L. (Chardon bleu, Reine de l'alpe ou Panicaut des Alpes) . . . . — 50

L'une des meilleures d'entre les plantes de montagnes et l'une des plus ornementales; malheureusement on vend très souvent d'autres espèces très inférieures sous ce nom-là. Le véritable Panicaut des Alpes est rare dans les cultures comme aussi dans la nature. Il veut un sol meuble et une position mi-ombragée dans la rocaille ou la plate-bande.

amethystinum L. . . . . . — 50
Bourgati Gouan. . . . . . — 50
cœruleum Bieb. . . . . . — 50
creticum Lam. . . . . . . — 50
dichotomum Desf. . . . . — 50
falcatum DC. . . . . . . — 50
giganteum Bieb. . . . . . — 50
glaciale Boiss. 2 50
maritimum L. . . . . . . — 50
multifidum Sibt. . . . . . — 50
planum L. . . . . — 50
spino-alba Vill. . . . . . — 50

Tous les Panicauts sont de bonnes pl. d'ornement; leurs tiges bleuâtres, leurs involucres plus ou moins finement divisés et d'un bleu plus ou moins intense, produisent pendant les mois de Juin à Septembre le plus bel effet dans les rochers ou la pleine terre. Ils aiment en général le soleil et le sol léger.

Erysimum

Helveticum DC. . . . . . — 50
linariæfolium Tausch. . . . — 50
ochroleucum DC. . . . . . — 50
pulchellum Willd. . . . . — 50
pumilum Gaud. . . . . . — 50
rupestre DC. . . . . . . — 50
Wahlenbergi Simonk. . . . 1 50
Wittmanni Zav. 1 50

Crucifères naines et formant de petits buissons bas; fleurs jaunes, parfois

très brillantes, surtout chez E. ochroleucum, pulchellum et pumilum, et très ornementales. Mai-Juin; r. ou pl. t.; mi-s. ou s.

Erythræa

chlodes Gr. et God. . . . . . — 50
diffusa Wood. . . . . . 1 —
elodes R. S. . . . . . . — 50
Gotlandica (Hort. Stock.) . — 50
littoralis Fries. . . . . . 1 —
pulchella Fries. . . . . . . — 50
scilloides Chaub. 1 50

Jolies petites Gentianées à fleurs roses. R.; s. ou mi-s.

Erythronium

albidum Nutt. 1 50
americanum Sw. 1 50
dens Canis L. (Dent de Chien) . — 50
» à fleurs blanches . . . 1 —
grandiflorum Pursh. 1 50
Hendersonni Hort. 2 50
Smithii Hort. 2 50
Sibiricum Rgl. 1 50

Eupatorium

ageratoides L. . . . . . — 50
album L. . . . . — 50
altissimum L. . . . . . — 50
aromaticum L. . . . . . — 50
maculatum L. . . . . . — 50
purpureum L. . . . . . . — 50
verticillatum Mühlb. . . . — 50

Bonnes plantes vivaces pour la pleine terre et la fleur coupée.

Euphorbia

capitata Lam. 1 50
Lathyris L. . . . . — 50
Myrsinites L.. . . . . . . — 50

L'E. Myrsinites est une belle plante ornementale à feuillage bleuâtre, ramassée en rameaux contournés en spirales, et qui fait le plus grand effet dans les rochers en plein soleil.

Falcaria

latifolia Koch. . . . . . — 50

Farsetia

clypeata R. Br. . . . . . — 50
lunarioides R. Br. . . . . — 50

Ferula

communis L. 1 50
gigantea Horn. 1 50

Ferula (*suite*).

orientalis L. 1 50
sylvatica Bess. . . . . . . — 50
thyrsiflora Sib. et Sm. . . . — 50

Belles ombellifères à feuillage finement divisé et à port architectural.

Festuca

glauca Lam. . . . . . . — 50
Halleri All. . . . . — 50
punctoria Sibth. . . . . . — 50

Ficaria

grandiflora Rob. . . . . . — 50
renunculoides Moench. . . . — 50
» à fleurs blanches . . . 2 50

Fragaria

indica Andr. . . . . — 50

Plante très sarmenteuse, à fleurs jaunes, à fruits rouge vif, et dont les longs sarments feuillés peuvent retomber très bas.

lucida Vilm. . . . . — 50
monophylla Duch. . . . . . — 50
sandwichensis Hort. . . . . — 50
semperflorens Hort. . . . . — 50

Frankenia

laevis L. 1 50

Francoa

ramosa Don. . . . . . . — 50
rupestris Poepp. . . . . . — 50
sonchifolia Cav. . . . . . — 50

Curieuses Saxifragées à placer dans les rochers ou la plate-bande; mi-soleil.

Fritillaria

Armena Boiss. . . . . . . 5 —
aurea Schott. 2 50
Bornmülleri Hausskn. . . . 5 —
Bucharica Rgl. . . . . . 5 —
Burnati Planchon 2 50
delphinensis Gren. (très rare) . 5 —
græca Boiss. et Sprün. . . . 2 50
Imperialis L. . . . . . — 50
lutea Bieb. 2 50
Meleagris L. . . . . . . — 50
» à fl. blanches . . . 1 —
montana Hoppe 2 50
Moggridgei Bor. 2 50
minor Led. 2 50
Oranensis Bak. 2 50
pallidiflora Schrk. 2 50
persica L. . . . . . . — 50

Fritillaria (*suite*).

- poliphylla Hort. 2 50
- pudica Sprgl. 2 50
- pyrenaica L. . . . . . 1 —
- racemosa Smith. 2 50
- recurva Gray. 2 50
- ruthenica Wikst. 2 50
- Sewerzowi Rgl. 2 50
- tristis Boiss. 2 50
- tulipifolia Bieb. 2 50

Funkia

- alba Andr. . . . . — 50
- albo-marginata Hook. . . — 50
- chinensis Sieb. . . . . . — 50
- cœrulea Andr. . . . . . . — 50
- cordata Sieb. . . . . . . — 50
- glauca Sieb. . . . . . . — 50
- glaucescens Hort. Sieb. . . — 50
- lanceolata Sieb. . . . . . — 50
- ovata Schult. . . . . . . — 50
- Sieboldiana Lodd. . . . . — 50
- sinensis Hort. Sieb. . . . — 50
- spathulata Sieb. . . . . . — 50
- subcordata Spr. . . . . . — 50

Les Funkia ou Hémérocalles orientales, sont d'excellentes plantes vivaces d'ornement. Leur feuillage hautement décoratif, leurs fleurs grandes et parfois très odorantes (celles du F. alba rappellent en plus fin et plus intense encore le parfum du Lys), leur rusticité à toute épreuve, le fait qu'elles s'adaptent bien aux positions ombragées, les recommandent à tous les propriétaires de jardins. Ce sont les seules plantes qu'on cultive avec succès au cœur-même de Londres, sur les terrasses tournées au nord et exposées à la fumée. La beauté de leurs feuilles, souvent teintées de plusieurs couleurs, serait, à elle seule, une recommandation suffisante pour les faire adopter plus généralement qu'elles ne le sont.

Une bonne terre franche et le mi-soleil, ou l'ombre, leur conviennent.

Gagea

- Liottardi Schult. . . . . 1 —
- lutea Schult. . . . . . . — 50

Gaillardia

- aristata Pursh. . . . . . — 50
- lanceolata Mich. . . . . . — 50
- picta Sweet. . . . . . . — 50

Bonnes plantes vivaces pour la pleine terre. Juillet-Octobre.

Galanthus

- Elwesii Bak. 1 50
- Forsteri Bak. 1 50
- Imperati Bert. . . . . . — 50
- latifolius Leichtl. 1 50
- nivalis L. (Perce-neige). . . — 50
- » à fl. doubles . . . . 1 —
- » umbricus Hort. . . . 1 50
- plicatus Bieb. . . . . . . — 50
- Redoutei Rupr. . . . . . — 50

Galactites

- tomentosa Moench. . . . . — 50

Galatella

- Dracunculoides DC. . . . . — 50
- hyssopifolia Nees (Aster hyssop.) — 50
- linifolia Nees . . . . . . — 50
- punctata DC . . . . — 50

Jolies plantes vivaces voisines des Asters, hautes de 50 cm à 1 m., excellentes pour la fleur coupée. Plates-bandes; s.

Galax

- aphylla L. 2 50

Galega

- officinalis L. . . . . . . — 50
- » à fl. blanches . . . . — 50
- orientalis L. . . . . . . — 50

Plantes vivaces, vigoureuses et très florifères, propres à la décoration des plates-bandes, talus arides et ensoleillés et grands massifs. Elles sont très envahissantes.

Gaura

- Lindheimeri Engel . . . . — 50

C'est l'une des meilleures plantes vivaces; elle produit, de Juin en Octobre, de belles fleurs d'un blanc rosé, qui se succèdent le long de ses tiges élégamment penchées.

Genista

- aetnensis DC. 2 50
- anglica L. 1 50
- corsica DC. 1 50
- Germanica L. . . . . . . — 50
- linifolia L. . . . . — 50
- pilosa L. . . . . — 50
- procumbens W. K. 1 50
- radiata Scop. 2 50
- Sagittalis L. . . . . . . — 50
- sibirica L. . . . . — 50

Genista (*suite*).

tinctoria L. . . . . . . — 50
villosa Lam. 2 50

Arbustes propres à garnir les rochers en plein soleil ; fl. jaunes.

Gentiana

1 acaulis L. . . . . . . 1 —
2 — à fl. blanches. . . 5 —
3 adscendens Pall. . . . 2 50
4 alpina Vill. 2 50
5 Andrewsi Griseb. . . . 2 50
6 angustifolia Vill. . . . 1 50
7 angustifolia Mich. . . . 5 —
8 asclepiadæa L. . . . 1 —
9 — à fl. blanches . . 1 50
10 bavarica L. . . . . . 1 —
11 brachyphilla Vill. . . . 1 —
12 brevidens Rgl. 1 50
13 Burseri Lap. 1 50
14 Clusii Perr. et Song. . . 1 —
15 ciliata L. . . . . . . 1 —
16 cœrulescens Rgl. . . . 1 50
17 cruciata L. . . . . . . — 50
18 decúmbens Rgl. . . . 1 50
19 Dinarica Beck. 2 50
20 Fetisowi Rgl. 1 50
21 frigida Haenke 2 50
22 imbricata Frœl. . . . 2 50
23 Kesselringii Rgl. . . . 2 50
24 lutea L. . . . . . . 1 —
25 macrophylla Pall. . . . 1 50
26 Olivieri Grsb. 1 50
27 glomerata Rgl. . . . 2 50
28 ornata Wall. 2 50
29 Pannonica Scop. . . . 1 50
30 phlogifolia Schtt. . . . 1 50
31 pneumonanthe L. . . . 1 —
32 pumila Jacq. 2 50
33 punctata L. 1 50
34 purpurea L. 1 50
35 purpurea var. nana . . 2 50
36 pyrenaica L. 2 50
37 Rhætica Kern. 2 50
38 septemfida Pall. . . . 1 50
39 — cordata Rgl. . . . 2 50
40 — glomerata Rgl. . . 2 50
41 — latifolia Rgl. . . 2 50
42 Thibetica King. . . . 2 50
43 Thomasii Vill. 2 50
44 verna L. . . . . . . — 50
45 — atrocœrulea Rgl. . 1 —

Gentiana (*suite*).

46 — à fleurs blanches. . . 1 50
47 — à fleurs bleu d'azur. 1 50
48 Walujewi Rgl. 1 50

Les différentes espèces de gentianes sont de nature et d'aspect très divers. Le groupe des acaulis nos 1, 2, 4, 6, 14, 19, comprend des plantes cultivées dès longtemps dans les jardins et qu'on utilise non-seulement dans les rochers, mais aussi comme pl. à bordures ; dans certains jardins anglais on en fait même des parterres. Ce sont des pl. basses et cespiteuses, à grandes fleurs dressées en forme de coupe et d'un bleu plus ou moins intense qui fleurissent d'avril en juin. Nos 3, 5, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 38, 41, 42 et 48 sont des pl. plus élevées (10-40 cm.) à fleurs bleues ou blanches qui demandent un sol spongieux, le mi-soleil et se plaisent dans le roc., comme en pl. t. et fleurissent de mai en août ; nos 8, 9 et 31 aiment l'humidité et le mi-soleil ; leurs fl. sont d'un beau bleu, sauf chez la var. d'asclepiadaca (juin-août). Nos 11, 15, 37 et 44-47 sont naines et cespiteuses, portent d'avril-mai des fleurs d'un bleu superbe et aiment la roc. et le plein soleil ; nos 10, 21, 22, 28, 32 et 36 sont des espèces appartenant à la haute montagne et fleurissant en mars-avril ; il leur faut la terre de bruyère mélanrée de sphagnum et de sable avec un peu de terre franche, la roc. et le soleil ; les nos 13, 29, 33, 34, 35 et 43 appartiennent à la région alpine et veulent la tourbe, la terre de bruyère et la terre franche et fleurissent de juin en juillet, mi-s. ; enfin le G. lutea (n° 24) est très recommandable comme pl. architecturale et ornementale ; ses grandes et belles feuilles glaucescentes, sa tige haute de plus d'un mètre et toute recouverte de fleurs jaune foncé, son port fier et noble lui donnent une grande valeur comme pl. de rocaille, de pl.-bande ou propre à isoler dans les gazons ; elle fleurit de mai en juillet.

Geranium

1 aconitifolium L'Hérit. . . — 50
2 — affine Ledeb. . . . — 50
3 Albanum Bieb. . . . . . — 50
4 argenteum L. 1 50
5 Armeniacum Boiss. . . . 1 —
6 asphodeloides Burm. . . — 50
7 cinereum Cav. . . . . . 1 —
8 cristatum Stev. . . . . — 50
9 Endressi Gay. . . . . . — 50

Geranium *(suite)*.

10 glandulosum Wink. . . . — 50
11 gymnocaulon DC. . . . — 50
12 grandiflorum Burm. . . — 50
13 Hookerianum Desf. . . — 50
14 Ibericum Cav. . . . . . — 50
15 Lancastriense With. . . . 1 —
16 lividum Willd. . . . . . — 50
17 lucidum L. . . . . . . — 50
18 macrorhizum L. . . . . — 50
19 Nepalense Sweet. . . . — 50
20 nodosum L. . . . . . . — 50
21 palustre L. . . . . . . — 50
22 phæum L. . . . . — 50
23 platypetalum Fisch. . . — 50
24 pratense L. . . . . . . — 50
25 roseum Andr. . . . . . — 50
26 sanguineum L. . . . . . — 50
27 sibiricum L. . . . . . . — 50
28 subcaulescens L'Hérit. . . 1 —
29 sylvaticum L. . . . . . — 50
30 — à fl. blanches. . . . 1 —
31 tuberosum L. . . . . . — 50
32 Wallichianum Sweet. . . — 50
33 Wlassovianum Fisch. . . — 50

Les Geraniums vivaces et rustiques sont très précieux pour l'ornementation des massifs et plates-bandes et ne devraient manquer dans aucun jardin; ils sont excellents pour la fleur coupée et la confection des bouquets. Leur rusticité, le fait que beaucoup d'entr'eux n'exigent aucun soin, les recommandent à chaque amateur de plantes.

Les n[os] 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32 et 33 sont d'excellentes pl. vivaces, à port élevé (25 cm. à 1 m.) et portant un très grand nombre de fleurs élégantes, roses, bleues ou blanches, qui vont fort bien en plates-bandes; n[os] 3, 14, 17, 18, 19, 20, 26 et 31 sont plus modestes comme port, offrent des fleurs également belles et s'étalent plutôt qu'elles ne s'élèvent; leur place est dans la rocaille, au mi-soleil ou sur les bords des plates-bandes; n° 1 est une alpine à fl. blanches veinées de pourpre qui demande le rocher, n° 4 est la plus curieuse et la plus jolie du groupe; ses f. luisantes, soyeuses, ses fl. grandes d'un rose violacé, veinées de pourpre, se succèdent de mai en juillet; c'est une plante naine et saxatile à laquelle il faut le r. et les n[os] 7, 15 et 28, sont de bonnes esp. à grandes fl. rose clair ou rose lilas et propres aux rocailles; mi-soleil.

Geum

Aleppicum Jacq. . . . . — 50
chiloense Balb. . . . . . 1 —

Très brillante espèce vivace à fl. d'un rouge vermillon, connue dans les jardins sous le nom de Coccineum (Mai-Août).

intermedium Ehrh. . . . — 50
Japonicum Thunb. . . . — 50
Kolbianum Stein. . . . 1 50
miniatum Hort. 1 50
molle Panc . . . . . . — 50
montanum L. . . . . . — 50
pyrenaicum Ram. . . . — 50
reptans L. . . . . 1 —

Superbe espèce saxatile des hauts sommets, à très grande fleur d'un jaune brillant.

Rhæticum Brügg. 1 50
rivale L. . . . . — 50
» pallidum Hort. . . — 50
Roylei Walt. . . . . . — 50
triflorum Pursh. 1 50
Tyrolense Brügg. . . . 1 —
Wildenowi Dietr. . . . — 50

Gladiolus

Anatolicus Haussk. . . . 2 50
communis L. . . . . . — 50
Illyricus Koch. . . . . — 50
imbricatus Roth. 1 50
palustris Gaud. . . . . — 50
segetum Ker. . . . . . — 50

Glaucium

Fischeri Bernh. . . . . — 50
leiocarpum Boiss. . . . — 50
luteum Scop. . . . . . — 50
Phœniceum Bieb. . . . — 50
rubrum Sib. et Sm. . . — 50
tricolor Bernh. . . . . — 50

Les Pavots cornus sont très appréciés comme plantes d'ornement grâce à leur beau feuillage bleuâtre, élégamment ondulé et velouté; fl. jaunes ou rougeâtres; fortes touffes de 25 c[m] à 1 m., produisant des fleurs tout l'été. Réussissent dans les sols les plus arides, les sables, les talus stériles, au soleil.

Gillenia

stipulacea Nutt. 1 50
trifoliata Mœnch. . . . 1 50

Deux excellentes Rosacées de l'Amérique septentrionale, très ornementales. Pl. t.; mi-s.

Globularia

cordifolia L. . . . . — 50
nana DC . . . . 1 —
nudicaulis L.. . . . . . . — 50
trichosantha Fisch.. . . . — 50
vulgaris L. . . . . — 50
» à fleurs blanches . . — 50
Willkommii Nym . . . . — 50

Glossocomia

clematidea Schrenk. . . . — 50

Très jolie et curieuse Campanule à fl. lilas clair, portant, au fond de sa cloche, des taches orangées et violet foncé. Mai-Juin. R. ; s. ou mi-s.

Gnaphalium

anatolicum Boiss. . . . . — 50
angustifolium Lam.. . . . . 1 —
Leontopodium *(Edelweiss)* :
fortes plantes (2 ans) . . . . 1 —
moyennes . . . . — 75
plantons d'une année . . . — 50

L'Edelweiss, ou Etoile d'argent, se cultive aisément dans un sol léger, composé de terreau de feuilles, de terre franche et de sable. Il lui faut le grand soleil, et, pour l'avoir bien blanche, il faut la placer dans le calcaire. R. ou pl. t.

Leontopodium sibiricum . . 2 50
» Himalayense Strach . . 5 —
» Margaritaceum L.. . . — 50

Goniolimon

Serbicum Panc 1 50
Tataricum Boiss. 1 50

Goodyera (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Goringianum

pictum 2 50

Elégante et curieuse Fougère rustique à frondes panachées de rose et de blanc (omise dans Cat. Fougères).

Grammitis (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Gymnadenia (Idem).

Gymnogramme (Idem).

Gunnera

magellanica Lam. 2 50
Scabra R. et Pav. 2 50

Gypsophila

acutifolia Fisch.. . . . . — 50
cerastioides Don. . . . . — 50

Gypsophila (*suite*).

paniculata L. 1 50
repens L. . . . . — 50

Cette dernière espèce est une des meilleures plantes tombantes. Elle est des plus gracieuses entre les rocs et retombe de plus d'un mètre le long des rocailles. Fleurs abondantes d'un blanc rosé et se succédant pendant tout l'été.

scorzoneræfolia Ser. . . . — 50

Habenaria (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Haberlea

Rhodopiensis Friv. 2 50

Hablitzia

thamnoides Bieb. . . . . 1 —

Plante grimpante du Caucase.

Hacquetia

epipactis DC . . . . — 50

Haleinia

ellyptica Don. 2 50

Harpalium

rigidum Cass. (V. Helianthus).

Hedysarum

altaicum Fisch. . . . . . . 1 —
boreale Nutt. . . . . 1 —
canadense L.. . . . . . . 1 —
elatum Rgl. . . . . 1 —
elongatum Fisch. . . . . . 1 —
flavescens Rgl. . . . . . . 1 —
multijugum Maxim. . . . . 1 —
neglectum Led. . . . . . . 1 —
obscurum L.. . . . . — 50
Sibiricum Poir. . . . . . . 1 —

Heimia

syphilitica DC 2 50

Helenium

autumnale L. . . . . — 50
Californicum Dcsne. . . . . — 50
Hoopesii Gray. . . . . . . 1 —

Les Hellènes sont de bonnes Composées vivaces, à fleurs jaunes, très propres à l'ornementation et à la garniture des plates-bandes et des grands rochers. Ils fleurissent de Juillet en Octobre. Le H. Hospesii est surtout recommandable ; il ne s'élève pas à plus de 40-50 cm, et porte de grandes belles marguerites d'un jaune orangé, qui sont très précieuses pour les bouquets et durent très longtemps. Pl. t. ou r. ; mi-s.

Helianthemum

1 alpestre Dun. — 50
2 apenninum Gaud. — 50
3 canum Dun. — 50
4 chamæcistuis Mill. — 50
5 Fumana Mill. — 50
6 grandiflorum DC — 50
7 » à fleurs doubles — 50
8 montanum Vis. — 50
9 polyfolium Koch. — 50
10 purpureum Hort. — 50
11 » à fleurs doubles 1 —
12 roseum DC — 50
13 sanguineum Hort. — 50
14 thymifolium Guss. — 50
15 variabile Spach. — 50
16 venustum Sweet — 50
17 vulgare DC. — 50

Les Hélianthèmes forment de charmants petits buissons nains et retombants, au feuillage persistant, se couvrant de fleurs pendant les mois de Juin, Juillet et Août, et supportant le plus ardent soleil. Excellentes pour roc. et pl. t. Les nos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16 et 17 sont à fl. jaunes : les 2, 9 et 14 à fl. blanches; les autres offrent toutes les teintes du rose tendre au rouge le plus foncé. On en fait de bonnes bordures.

Helianthus

1 angustifolius L. (H. orgyalis) — 50
2 atrorubens L. — 50
3 doronicoides Lam. — 50
4 giganteus L. — 50
5 lætiflorus Pers. — 50
6 Maximiliani Schrad. — 50
7 multiflorus L. — 50
8 » à fleurs doubles — 50
9 rigidus Desf. (Harpalium rigid.) — 50
10 trachellifolius Willd. — 50
11 tuberosus L. — 50

Belles et bonnes Composées à floraison tardive (Juillet, Octobre, Novembre), à fleurs jaunes connues sous le nom de Soleils vivaces ou Tournesols. Leurs beaux et nombreux capitules jaunes, petits ou grands, isolés ou disposés en panicules, sont l'un des beaux ornements de nos plates-bandes ou du Jardin sauvage. Ce sont également d'excellentes plantes pour la fleur coupée. Elles ne réclament qu'un sol sain et meuble et du soleil. Les nos 1, 4, 5, 10 et 11 sont des plantes très élevées dont les tiges atteignent 2 et même 3 mètres de haut; nos 2, 3, 6, 7 et 8 sont des espèces plus basses et très florifères ; l'H. rigidus est le meilleur de tous les H., tant par ses grandes et belles fleurs jaune vif et leur profusion que par son port élégant ; elle ne devrait manquer dans aucun jardin car elle est très précieuse pour la fleur coupée.

Helichrysum

angustifolium DC — 50

Heliopsis

lævis Pers. — 50
patula Wend. — 50

Composées à fleurs jaunes, bonnes pour plates-bandes.

Helleborus

Abschasicus R. Br. 1 —
altifolius Hayn. 2 50
angustifolius Hort. 2 50
antiquorum R. Br. 1 —
atrorubens W. K. 1 —
colchicus Rgl. 1 50
fœtidus L. — 50
guttatus R. Br. 1 50
niger L. (Rose de Noël) 1 —
occidentalis Reut. 1 50
orientalis Lam. 1 —
Olympicus Lindl. 1 50
pallidus Host. 1 50
purpurascens W. K. 1 50
viridis L. 1 —

Hemerorallis

cruenta Hort. 1 50
disticha Don. 1 —
Dumortieri Morr. 1 50
flava L. — 50
fulva L. — 50
Middendorfii Traut. 1 50

Heracleum

alpinum L — 50
giganteum Fisch. — 50
Wilhelmsii Fisch. — 50

Grandes ombellifères (les deux dernières aux formes gigantesques) qu'on utilise dans les grands rochers ou les pelouses où grâce à leurs lignes architecturales et à leur port élégant, elles font très grand effet.

Herminium (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Hermione

similis Salisb. 2 50

Herniaria

alpina Vill. . . . . . . — 50

Heuchera

americana L. . . . . . — 50
Himalayensis DC . . . . — 50
Menziesii Hook. . . . . — 50
micrantha Dougl . . . — 50
rosea Zabel. 1 50
sanguinea Engelm. . . . 1 50
villosa Mich.. . . . . . — 50

Ce sont des Saxifragées au port élégant, au feuillage gracieux, aux fl. nombreuses, petites, munies d'anthères orangées et brillantes qui forment des touffes de 20-30 cent. de haut, et fleurissant de Mai en Juillet. R. ou pl. t. ; o. ou mi-s. Le H. sanguinea est une espèce très brillante, absolument distincte et l'une des meilleures des plantes vivaces. Ses nombreuses fleurs d'un rouge corail très vif, ramassées en grappes dressées, hautes de 25-30 cm, se succèdent pendant les mois d'Avril-Juillet et sont l'un des plus brillants ornements des roc. et plates-bandes. Il lui faut le soleil.

Hibiscus

roseus Lois 1 50
» à fleurs blanches . . 2 50
» grandiflorus 2 50

L'une des plus brillantes d'entre les plantes vivaces; très grandes fleurs de mauves, sur des tiges de 1m,25 à 1m,50 de haut. Pl. t. Août-Septembre.

Hieracium

albidum Vill. . . . . . — 50
alpinum L. . . . . . . — 50
aurantiacum L. . . . . — 50
lanatum Vill. . . . . . — 50
Pelleterianum Mer. . . . — 50
villosum Jacq. . . . . . — 50

Les Epervières sont des plantes de rochers à fleurs jaunes; l'H. aurantiacum, de teinte rouge vif ou orangé foncé est très recommandable; il fleurit de Mai en Octobre.

Hippocrepis

comosa L. . . . . — 50

Homogyne

alpina L.. . . . . — 50
discolor Cass. 2 50
sylvestris Cass. . . . . 1 —

Horminum

pyrenaicum L. . . . . . . — 50

Hoteya

japonica Dcsne . . . . . — 50

Jolie Saxifragée connue aussi sous le faux nom de Spiræa Jap., et très propre à garnir les lieux mi-ombragés; fl. blanches en grappes dressées. Mai-Juillet.

Hottonia

palustris L. 1 50

Plante aquatique à fleurs de Primevères, étagées et d'un lilas clair.

Houstonia

cœrulea L. 2 50
» à fl. blanches . . . 2 50

Gracieuses Gentianées de l'Amérique septentrionale.

Hugueninia

tanacetifolia Reich.. . . . 1 —

Hutschinsia

alpina R. Br. . . . . . — 50

Très jolie petite Crucifère saxatile bonne à garnir les fentes des rochers à l'ombre; fleurs blanches; Avril-Juin.

Hyacinthella

leucophæa Boiss. 1 50

Hyacinthus

1 amethystinus L. . . . . 1 —
2 candicans Baker. . . . 1 —

No 1, jolie Jacinthe à fleur d'azur; R. ou pl. t. No 2 belle espèce à large feuillage ornemental glaucescent, à grandes fleurs blanches en forme de cloches retombantes. Juillet-Septembre. Pl. t.

Hydrocharis

Morsus Ranæ L. . . . . . 1 —

Curieuse et jolie aquatique.

Hypericum

amplexicaule Lam. . . . . — 50
Androsæmum L. . . . . — 50
Ascyron L. . . . . . . — 50
atomarium Boiss. . . . . — 50
aureum Lour. . . . . . 1 —
bacciferum L. . . . . . — 50
Baeticum Boiss. . . . . — 50
calycinum L. . . . . . — 50
caprifolium Boiss. . . . . — 50

Hypericum *(suite).*

commutatum Nolt. . . . — 50
Coris L. . . . . . . 1 —
crispum L. . . . . . — 50
cuneatum Poir. 1 50
delphicum Boiss. . . . — 50
Deschampi Boiss. . . . — 50
dubium L. . . . . . — 50
eleatum Ait. . . . . . — 50
elegans Steph. . . . . — 50
eloides Boiss. . . . . — 50
empetrifolium Willd. . . 1 50
Gebleri Led. . . . . . — 50
hircinum L. . . . . . — 50
japonicum Thumb. . . . 1 —
Kalmianum L. . . . . — 50
linearifolium Vahl. . . — 50
montanum L. . . . . . — 50
Nepalense Chois. . . . — 50
nummulariæfolium L. . . 1 —
oblongifolium Boiss. . . 2 —
Olympicum L. . . . . — 50
orientale L. . . . . . — 50
patulum Thunb. . . . 1 —
Richeri Vill. . . . . . — 50
tomentosum L. . . . . — 50
Sarothra Mich. . . . . — 50
Webbi Steud. . . . . . — 50

Hypochæris

Helvetica L. . . . . . 1 —

Hyssopus

officinalis L. . . . . . — 50
— à fl. blanches. . . — 50
— à fl. rouges. . . . — 50

Iberis

corifolia Sweet. . . . . — 50
Garrexiana All. . . . . — 50
Gibraltarica L. . . . . — 50

Charmant arbuste rampant à grandes ombrelles lilas clair; très florifère et propre à égayer les rocailles au soleil pendant tout l'été.

jucunda Schott. . . . 1 —

L'une des plus jolies plantes à roc.; corolles d'un rose chair, veinées de rose plus foncé.

saxatilis L. 1 50
sempervirens L. . . . . — 50

Excellente pl. à roc.; floraison abondante et de longue durée (printemps), d'un beau blanc pur; bonnes pour bordures; s.

Iberis *(suite).*

stylosa DC. fleurs lilas en février-mars 1 —
Taurica DC. . . . . . — 50
Tenoreana DC. . . . . — 50

Imperatoria

Ostruthium L. . . . . — 50

Incarvillea

Koopmanni Hort. . . . 1 50
Delawayi Franchet. . . 2 50
Olgæ Rgl. 2 50
sinensis Lam. . . . . . 1 —

Très belles pl. vivaces pour la pl.-b. ou le roc., de la famille des Bignoniacées, à fleurs roses ou rouges et très élégantes. S. ou mi-s.

Inula

Britanica L. . . . . . — 50
glandulosa Willd. . . . — 50
Helenium L. . . . . . — 50
Hookeri L. . . . . . . — 50
oculus Christi L. . . . — 50

Jolies composées à fleurs jaunes, rappelant les Arnica, hautes de 15 à 50 cm. et fleurissant dans l'été. I. glandulosa est l'une des meilleures pl. alp. et l'un des plus précieux ornements des plates-bandes et massifs, ainsi que des rochers; l'Aulnée glanduleuse ne doit manquer dans aucun jardin.

Ipomœa

Pandurata Meyer (Convolvulus Pand.). . . . . 5 —

Superbe Liseron vivace à tiges grimpantes, hautes de 2 à 4 m., portant de belles f. d'un vert foncé luisant et une abondance de belles fleurs blanches à gorge pourpre (juillet-septembre). Pl. très rare dans les jardins; sol profond, s.

Iris

alata Poir. 1 50
albicans Lange 1 50
amœna DC. (I. hybrida Retz) . 1 50
aphylla L. (I. Bohemica Schmidt) . — 50
arenaria W. et K. . . . 1 50
asiatica Stapf. . . . . 1 —
aurea Lindl. . . . . . 1 —
Balkana Janka . . . . 1 —
biflora L. (I. nudicaulis) . 1 50
caucasica Hoff. 1 50
chamæiris Bert. . . . — 50
Ciengialti Ambr. . . . 1 —

Iris (*suite*).

Corygei Lange	1	50
cristata Ait.	1	—
dænensis Kotschy	—	50
desertorum Ker.	1	50
Douglasiana Herb.	1	50
ensata Thunb. (I. biglumis)	—	50
flavescens DC.	1	—
flexuosa Murr.	1	50
Florentina L.	—	50
fœtidissima L	—	50
fulva Muhl.	1	—
Germanica L.	—	50
— alba Red.	—	50
— cœrulea Desf.	—	50
graminea L.	—	50
var. inodora Hort. (I. stenogina Red.).	1	50
Guldenstœdtiana Lepr.	—	50
Histrio Reich.	1	—
Hookeri Fost.	1	50
humilis Bieb.	1	50
iberica Hoffm.	1	50
Italica Parl.	—	50
Japonica Thunb.	1	50
juncea Desf.	1	—
Kochii Kern.	—	50
Kœmpferi Sieb (v. I. lævigata).		
lævigata Fisch. et Mey.	—	50
longipetala Herb.	1	—
lurida Ait.	1	50
Lusitanica Kern.	1	50
lutescens Lam.	—	50
Mandraliscæ Tod.	1	50
Missouriensis Nutt.	1	50
Monnieri DC.	1	—
neglecta Horn.	—	50
notha Bieb.	—	50
Olbiensis Hénon.	—	50
— à fl. jaunes.	1	—
orchioides Bak.	1	50
Palæstina Boiss.	2	50
pallida Lam.	—	50
panormitana Tod. (I. pseudo-pumila)	—	50
persica L.	1	50
plicata Lam.	—	50
prismatica Pursh.	1	—
pseudo-acorus L.	—	50
pumila L.	—	50
— cœrulea Spach.	—	50
— à fl. jaunes.	1	50

Iris (*suite*).

pyrenaica Bieb.	1	—
reticulata Bieb.	1	50
rubromarginata Baker	1	50
ruthenica Schur.	1	—
Sambucina L.	—	50
sicula Tod.	1	50
sibirica L.	—	50
— à fl. blanches	1	—
Sisyrinchium L.	1	—
Sogdiana Bunge.	1	50
Songarica Schrenk.	—	50
spectabilis Spach.	1	50
spuria L.	—	50
squalens L.	—	50
Statellæ Tod.	1	50
subbarbata Joo.	1	—
Suziana L.	1	—
Swertii Lam.	—	50
tectorum Maxim.	—	50
Tingitana Boiss. et Reut.	2	50
tripetala Walt.	1	50
trigonocarpa Braun.	1	50
tuberosa L.	1	—
vaga Fost.	1	—
versicolor L.	—	50
virescens Red.	—	50
virginica L.	1	—
xyphium L.	1	—

Isopyrum

thalictroides L.	—	50

Ixiolyrion

brachyanthus Fisch.	2	50

Janthe

bugulifolia Griseb.	1	—

Jasione

montana L.	1	50
perennis L.	1	50

Jeffersonia

diphylla Pers.	2	50

Très intéressante Podophyllée de l'Amérique du Nord; o.

Juniperus

communis L.	1	—
nana Willd.	1	50
Sabina L.	1	50
suecica Mill.	1	50

Les Genièvres de montagnes sont fort jolis dans les rocailles; les J. nana

Juniperus (*suite*).

et Sabina sont des arbustes rampants et se traînent sur le sol; ils produisent un grand effet par leur verdure sombre et persistante. S.

Jurinæa

acaulis Som. 1 50

Kernera

Boissieri Reut. . . . . — 50
saxatilis Reich. . . . . — 50

Lactuca

chondrillæflora Bor. . . 1 50
perennis L. . . . . . . — 50

Lachenalia

serotina Willd. . . . . 1 —

Lancea

Tibethica Hook f. et Thoms. 2 50

Lapiedra

Martinezii Lag. 2 50

Lappa

major Gærtn . . . . . — 50

Larix

dahurica Law. 1 50
europæa DC. . . . . . — 50
Sibirica Nois. 1 50

Laserpitium

latifolium L. . . . . . — 50
nitidum Zant. . . . . . — 50
Panax Gouan. . . . . . — 50
Siler L. . . . . — 50

Ombellifères à feuillage ornemental et à port élégant, à placer dans les pelouses et les roc.; 25 c. à 1 m. de haut. S. ou mi-s.

Lathyrus

latifolius L. . . . . . . — 50
grandiflorus Bot. May. . . — 50
heterophyllus L. . . . . — 50
sylvestris L. . . . . . . — 50
tuberosus L. . . . . . . — 50

Lavandula

latifolia Ehr. . . . . . — 50
spica DC. . . . . . . — 50
vera DC. . . . . — 50

Les Lavandes sont recommandables, non-seulement comme pl. aromatiques, mais aussi à cause de leurs fleurs bleu foncé précieuses pour les bouquets et de leur port de petit arbuste à f. grisâtre, qui les rend très propres à la confection des bordures de jardins; r. ou pl. t.; s.

Leontopodium. V. Gnaphalium.

Leontice

Alberti Rgl. . . . . . . 5 —

Lepidium

alpinum L. V. Hutschinsia.

Leptinella

dioica Hook. 1 50
scariosa Cass. 1 50

Jolies composées à port absolument ras et rampant, à rameaux couchés sur le sol et formant un vrai tapis. R., s. ou mi-s.

Lespedeza

polystachya Mich. 2 50

Leucanthemum

Voir Chrysanthemum.

Leucojum

æstivum L. . . . . . . — 50
carpathicum Steud. . . . 1 50
Fernandezi Camb. 2 50
roseum Lois. 1 50
vernum L. (Nivéole). . . . — 50

Levisia

redivisa Pursh. . . . . . 3 —

Liatris

pumila Lodd. . . . . . . 1 —
spicata Willd. . . . . . 1 —

Curieuses composées propres à l'ornementation des plates-bandes.

Ligularia

macrophylla DC. . . . . . 1 —
Sibirica Cass. . . . . . 1 —
speciosa Fisch. . . . . . 1 —

Bonnes pl. vivaces, de la famille des composées, à beau feuillage ornemental, à fl. jaunes, disposées en épis sur des tiges de 1 m. à 1 m. 50.

Levistichum

officinale Koch. . . . . . — 50

Lilium

Albanicum Griseb. . . . . 5 —
auratum Lindl. 2 50
bulbiferum L. . . . . . . 1 —
canadense L. 2 50
candidum L. . . . . . . — 50
carniolicum Bernh. . . . 2 50

Lilium (*suite*).

chalcedonicum L. 2 50
croceum Chaix. . . . . — 50
dahuricum Ker. 2 50
dalmaticum Maly 2 50
elegans Hort. 2 50
Jankæ Kern. . . . . . 5 —
Heldreichii Freyn. . . . 5 —
lancifolium Hook. . . . 1 50
longiflorum Thunb. . . . 2 50
Martagon L. . . . . . — 50
— à fl. blanches. . . . 5 —
monadelphum Bieb. . . . 2 50
Pardalinum Kellog. . . . 5 —
Philadelphicum L. . . . 2 50
Pomponium L. 2 50
pyrenaicum Gouan. . . . 1 —
superbum L. 2 50
tenuifolium Fisch. . . . 2 50
testaceum Lindl. 2 50
Thunbergianum Schult. . . 2 50
tigrinum Gawl. 1 50
umbellatum DC. 1 50

Limnanthemum

nymphoides Link (aquatique). 1 —

Linaria

æquitriloba Sprg. . . . . — 50
alpina DC. . . . . . . — 50
Charmante petite plante rampante à fleurs bleu-violet foncé et à tache rouge sur la lèvre.
anticaria Boiss. . . . . . — 50
Très jolie Linaire à fleurs blanches, à taches violet noirâtre sur la lèvre inférieure.
capreria Moris . . . . . — 50
Cymballaria Mill. . . . . — 50
(Ruine de Rome).
dalmatica Mill. . . . . . — 50
genistæfolia Mill. . . . . — 50
hepaticæfolia Poir. . . . — 50
Minuscule Ruine de Rome qui demande le soleil et le sec.
italica Trevir. . . . . . — 50
linifolia Willd. . . . . . — 50
macedonica Gris. . . . . — 50
origanifolia DC. . . . . — 50
pallida Ten. . . . . . . — 50
Pancicii Janka. . . . . . — 50
petræa Jord. . . . . . . — 50
pilosa DC. . . . . — 50

Linaria (*suite*).

purpurea Mill. . . . . . — 50
repens Steud. . . . . . — 50
rubioides Vis. . . . . . — 50
tristis Mill. . . . . . . — 50
Bonnes pl. à roc. qui toutes, sauf le L. Cymballaria, demandent le soleil.

Lippia

repens Spr. . . . . . . — 50
Jolie verveine-miniature à longs rameaux se traînant sur le sol et entre les pierres et produisant de petits capitules de fl. pendant tout l'été et jusqu'à l'entrée de l'hiver. R. ou pl. t.; soleil.

Lindelofia

longiflora Baill. . . . . 1 —
spectabilis Lehm. . . . . — 50
Boraginées à fl. d'un bleu foncé; juin-août. R. ou pl. t.; s. ou mi-s.

Linnæa

borealis L. 2 50
Très gracieuse plante alpine bien connue par son cachet d'originalité et la beauté de ses fleurs roses et odorantes. R.; o.

Lynosiris

vulgaris L. . . . . . . — 50

Linum

alpinum L. . . . . . . — 50
austriacum L. . . . . . — 50
flavum L. 1 50
salsoloïdes Lam. . . . . — 50
tenuifolium L. . . . . . 1 —

Liparis (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Listera (Idem).

Lithospermum

Gastoni DC 2 50
graminifolium Viv. . . . 2 50
petraeum DC (V. Echium).
prostratum Loïs. 2 50
purpureo-cœruleum L. . . — 50

Lloydia

serotina L. 2 50

Lobelia

cardinalis L. . . . . . . — 50
fulgens Willd. . . . . . — 50
siphylitica L. . . . . . — 50
» à fleurs blanches . . — 50
Bonnes plantes vivaces pour la plate-

Lobelia *(suite)*.

bande ou les grands rochers. Les deux premières sont à fleurs rouge vif et font un grand effet. Juillet-Octobre.

Lomaria (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Lonicera

Alberti Rgl. (chamæcerasus alb.) . . 2 50

Très joli petit arbrisseau au feuillage glauque, aux nombreuses fleurs rose chair odorantes.

alpigena L.	1	—
canescens Schousb.	1	—
chrysantha Turtsch.	1	—
cœrulea L.	1	—
diversifolia Wall.	1	—
Grata Ait.	1	—
Ledebouri Eschl.	1	—
Morrowi A. Gray	1	—
nigra L.	1	—
occidentalis Steud.	1	—
orientalis Lam.	1	—
parviflora Lam.	1	—
punicea Sims.	1	—
pyrenaica L.	1	—
Regeliana Kirch.	1	—
Ruprechtiana Rgl.	1	—
splendida Boiss.	2	50
villosa Mühl.	1	—

Les Chèvrefeuilles de montagnes sont très propres à la décoration des grands rochers ou des jardins naturels ou pittoresques; ils aiment le mi-ombre et la fraîcheur.

Lunaria

rediviva L.

Luzula

lutea DC	—	50
nivea DC	—	50

Gracieuses Joncacées à épis laineux et jaunes chez lutea, blancs chez nivea, faisant un effet charmant dans les sous-bois et les parties ombragées des rocailles et des jardins. Juillet-Septembre.

Lychnis

1	alpina	—	50
2	Bungeana Fisch.	1	—
3	chalcedonica L. (Croix de Malte)	—	50
4	» à fleurs doubles	1	—
5	cœli rosea Desv.	—	50
6	coronaria L.	—	50

Lychnis *(suite)*.

7	» à fleurs blanches	—	50
8	flos cuculi L.	—	50
9	» à fleurs blanches	—	50
10	flos Jovis L.	—	50
11	fulgens Fisch.	—	50
12	grandiflora Jacq.	—	50
13	Haageana Hort.	—	50
14	Lagascae Nym.	1	—
15	Lapponica L.	—	50
16	Sartorii Boiss.	—	50
17	Sieboldi Van Houtte	1	—
18	Viscaria L.	—	50
19	» à fl. doubles	1	—

Les Lychnides sont de bonnes plantes vivaces dont plusieurs (nos 11 et 13 surtout) sont d'entre les plus brillantes des plantes de jardins. Les nos 1 et 15 sont de petites espèces naines, à fl. rose vif, fleurissant de Mars en Avril; r.; mi-s. N° 14 est une plante saxatile à placer dans les fentes des rochers au soleil; 2, 11, 12, 13 et 17 sont des plantes asiatiques de grande valeur ornementale, et qui produisent de belles et grandes fleurs, souvent très brillantes, de Mai en Août. Pl. t. ou roc.; s. ou mi-s. Les autres sont de bonnes pl. vivaces de pl.-bandes, donnant d'excellentes fl. à couper et produisant un joli effet dans les jardins. Tous sont de culture aisée.

Lycopodium

alpinum L.	1	—
Selago L.	2	50

Lycium

Mediterraneum Dun.	2	50

Lysimachia

atropurpurea L.	—	50
ciliata L.	—	50
Japonica Thunb.	—	50
Leschenaultii Dub.	—	50
nemorum L.	—	50
nummularia L.	—	50

Excellente plante à bordures ou propre à former des tapis dans les lieux humides; rameaux longs, traînant sur le sol et produisant de nombreuses et belles fleurs jaune vif.

nummularia aurea	—	50
punctata L.	—	50

Bonne plante vivace à fl. jaune vif disposées en grappes dressées, hautes

de 1 m. et davantage. Mai-Août; pl. t. ; s.

thyrsiflora L. . . . . . — 50

Lysimachia

verticillata Bieb. . . . . — 50
violacens Franch. . . . . — 50
vulgaris L. . . . . . . — 50

Lythrum

Salicaria L. . . . . . . — 50

Maclaya

cordata R. Br. . . . . . — 50

Belle plante vivace ornementale, à tiges hautes de 2-3 mètres, garnies de belles feuilles glauques sinuées, dentées et terminées par un long épi de fleurs roses. Juillet-Septembre. Pl. t.; excellente pour isoler dans les parterres où elle produit un grand effet.

Mahonia

repens Don. 1 50

Mandragora

officinalis Mill. . . . . . 5 —

Margyricarpus

setosus R et P. 1 50

Marshallia

cæspitosa Nutt. . . . . 1 —

Mathiola

pedemontana Gremli . . 2 50
sinuata R. Br. . . . . . 1 —
tristis R. Br.. . . . . . 1 —
valesiaca Boiss. 2 50

Crucifères au parfum suave (ce sont des Giroflées vivaces) et à l'aspect curieux; les M. pedem. et vales. sont très rares. R.; s.

Mayanthemum

bifolium Lam. . . . . . — 50

Le petit Muguet des montagnes. R. ou pl. t.; ombre.

Meconopsis

cambrica Vig. . . . . . — 50
» var. 1 50
Nepalensis Wall. . . . 2 50
petiolata DC 2 50
Wallichiana Baker. . . . 2 50

Pavots à fleurs jaunes (bleues chez Wallichiana), et demandant la rocaille, la fraîcheur et l'humidité.

Melissa

officinalis L. (mélisse) . . — 50

Melitis

melyssophyllum L. . . . . — 50

Mentha

piperita L. . . . . . . — 50
Requieni Benth. (Thymus corsicus) — 50

Minuscule plante à rameaux couchés sur le sol et se grippant aux rocs, fortement aromatique, à peine haute de quelques millimètres et d'un vert très gai. R.; o. et fraîcheur ou bien vieux murs tournés au nord.

Menyanthes

trifoliata L. (Trèfle d'eau) . . . — 50

Belle plante aquatique.

Merendera

bulbocodium Ram. 1 50
caucasica Bieb. 1 50
Ruthenica Boiss. 1 50
sobolifera Fisch et Mey. . . 1 50

Mertensia

paniculata G. Don. . . . . 1 —
Sibirica G. Don.. . . . . 1 —
virginica DC. 1 50

Trois superbes Boraginées à fleurs d'un bleu céleste.

Meum

athamanticum Jacq. . . . 1 —
mutellinum Gærtn. . . . . 1 —

Deux jolies Ombellifères à feuillage fin et très ornemental. R.; mi-s.

Micromeria

Græca Benth. . . . . . 1 —
Juliana Benth. . . . . . 1 —
myrtifolia Boiss. . . . . 1 —
rupestris Reich.. . . . . 1 —

Petites Labiées aromatiques à fl. roses, propres à garnir les roc. au sol.

Mimulus

Cardinalis Lindl. . . . . — 50
luteus L. . . . . — 50

Jolies pl. vivaces basses, à fl. rouge vif chez la première, jaune brillant chez la seconde; Mai-Octobre. R. ou pl. t.; mi-o.

Mitchella

repens L.. . . . . 1 50

Mitella
diphylla L. . . . . . . — 50
pentandra Hook. . . . . — 50

Modiola
geranioides Gill. 2 50

Mœhringia
glaucovirens Bert. 2 50
muscosa L. . . . . . . — 50
pendula Fenzl. 2 50
polygonoides M. et Kit. . . — 50
Ponæ Fenzl. 2 50

Jolies mousses alpines à fl. blanches pour les R. à l'ombre.

Molospermum
cicutarium DC. 1 50

Morine
Coulteriana Royle. 1 50
longifolia Wall. . . . . . — 50
persica L. 1 50

Pl. superbes, à feuillage d'Acanthes et à fl. roses formant de longues grappes dressées, hautes de près d'un mètre; r. ou pl. t.. s.

Morisia
hypogæa Gay. 2 50

Belle crucifère des montagnes de la Corse et de la Sardaigne, à fl. jaune vif, acaules et formant une touffe naine et très brillante. R.; s.

Mühenbeckia
adspersa Trin. 2 50
compressa Meissn. 2 50

Deux jolis arbustes nains et traînants, au port extrêmement original et très propres à garnir les roc.; s.

Mulgedium
alpinum L. . . . . — 50
integrifolium Cass. . . . . — 50
macrophyllum DC. . . . . — 50
multiflorum DC. . . . . . — 50
prenanthoides DC. . . . . — 50
Plumieri DC. (Sonchus P.). — 50
sibiricum Less. . . . . . — 50
tataricum DC. . . . . . . — 50

Muscari
botryoides Mill. . . . . . — 50
commutatum Guss. . . . . — 50
comosum Mill. . . . . . . — 50
moschatum Desf. 2 50
racemosum Willd. . . . . — 50
Szowitzianum Rupr. . . . 1 —

Myosotis
alpestris Schr. . . . . . — 50
palustris With. . . . . . — 50
Reihsteinerii Wartm. . . . 1 50

Myrica
cerifera L. 1 50
Galle L. 1 50

Myrrhis
odorata L. . . . . — 50

Narcissus
aureus DC. 1 50
biflorus Curt. . . . . . . — 50
Bulbocodium L. . . . . . 1 —
cernuus Salisb. var. alpinus 1 50
dubius Gouan. 1 50
incomparabilis Curt. . . . — 50
Jonquilla L. . . . . 1 —
juncifolius Reg. . . . . . — 50
muticus Gay. . . . . . . 1 —
nivalis Gr. (Corbularia). . 2 50
obesus Salisb. 1 50
papyraceus Ker. . . . . . 1 —
poëticus L. . . . . — 50
— à fl. doubles. . . 1 —
pseudo-Narcissus L. . . . — 50
— à fl. doubles . . . 1 —
radiiflorus Salisb. . . . . — 50
Rigoï Freyn. 2 50
Tazetta L. . . . . — 50

Nardosmia
fragrans Reich. (Petasites fragrans) — 50

L'Héliotrope d'hiver est une bonne pl. vivace qui, placée dans une plate-bande abritée, produit, tout l'hiver durant, des fleurs d'un brun-violacé répandant un fort parfum de vanille.

Neogaya
mucronata Schenk. 1 50

Nepeta
granatensis Boiss. . . . . — 50
macrantha Fisch. . . . . — 50
nuda L. . . . . — 50

Nephrodium (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Nierembergia
rivularis. 1 50

Nigritella (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Notochleana (Idem.)

Nuphar
luteum Sm. 2 50
pumilum Sm. . . . . . 5 —
Pl. aquatiques à fl. jaunes.

Œnothera
Fraseri Pursh. . . . . . — 50
fruticosa L. . . . . . . — 50
macrocarpa Push. (missouriensis). . . . . — 50
L'une des meilleures pl. vivaces naines; rameaux étalés sur le sol et émettant, de Mai en Octobre, de grandes fl. d'un jaune clair brillant; r. ou pl. t.; sol profond; s. ou mi-s.
pumila L. . . . . — 50
speciosa Nutt. . . . . . . — 50
Superbe esp. à grandes fl. rose clair, fleurissant en mai ou août.
taraxacifolia Sweet. . . . . — 50

Omphalodes
Luciliæ Boiss. 2 50
verna L. . . . . — 50
— à fl. blanches . . . — 50

Onobrychis
Laconica Orph. . . . . . . — 50

Onoclea (Voir Cat. Foug. et Orchid. rust.)

Ononis
cenisia L. . . . . 1 —
fruticosa L. . . . . . . 1 —
natrix L. . . . . 1 —
rotundifolia L. . . . . . 1 —
Petits arbustes très propres à garnir les rochers en plein soleil. Mai-juill.

Onosma
echioides L. 1 50
Helveticum Boiss. 2 50
stellulata W. et K. 1 50
taurica Pall. . . . . . . 2 —
Jolies Boraginées viv. à fl. jaunes; s. Juin-Août.

Ophrys (Voir Cat. Orchid. et Foug. rust.)

Ophyoglossum (Idem.) —

Ophyopogon
japonicum Kerr. . . . . . — 50
spicatus Kerr. . . . . . — 50

Opuntia
brachyarthra Engelm. . . . 1 50
Comanchica Engelm. . . . 1 —

Opuntia (*suite*).
humilis Haw. 1 50
missouriensis DC. . . . . . 1 —
Raffinesquiana Engelm. . . 1 50
vulgaris L. . . . . 1 —
Les seules Cactées rustiques chez nous. L'Opuntia vulgaris est l'une des plantes les plus curieuses et les plus intéressantes de notre centre européen. Seule parmi les Cactées elle est indigène dans l'Ancien Monde. Elle couvre les rochers dans certaines vallées des Alpes et ses fleurs jaunes se voient de loin au moment de la floraison. Elle est parfaitement rustique et réussit dans tous les sols légers; demande le plein soleil.

Orchis (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Origanum
creticum L. . . . . — 50
libanoticum Boiss. . . . . — 50
stoloniferum Bess. . . . . — 50

Ornithogalum
Balansæ Boiss. . . . . . . — 50
contortum Ten. . . . . . . — 50
exscapum Ten. . . . . . . — 50
longebracteatum Jacq. . . . — 50
nanum Sibt. . . . . — 50
nutans L. . . . . — 50
Pater Familiæ God. . . . . — 50
pyrenaicum L. . . . . . . — 50
umbellatum L. . . . . . . — 50

Orobus
alpestris W. K. . . . . . 1 —
aureus Stev. 1 50
canescens L. . . . . . . — 50
lathyrioides L. . . . . . — 50
luteus L. . . . . — 50
niger L. . . . . — 50
variegatus Lap. . . . . . — 50
vernus L. . . . . — 50

Osmanthus
aquifolius Sieb. 1 50

Osmunda (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Oxyria
dygina Campd. . . . . . . — 50
elatior R. Br. à pétioles rouge sang. . . . . . — 50

Oxytropis
campestris DC. 1 50
cyanea Bieb. 2 50

Oxytropis (*suite*).

fœtida DC. 1 50
montana DC. 1 50
ochroleuca Bunge. . . . 2 50
pilosa DC. 2 50
strobilacea Bunge 2 50

Les Oxytropis sont de jolis petits arbuscules absolument nains et formant de gracieuses touffes hautes à peine de 10 cm., se couvrant en mai-juillet, de fleurs rose vif, bleues, jaunes ou blanches, ressemblant un peu à celles des Coronilles. O. montana est le meilleur du genre. R.; s.

Pachystigma

Canbyi Höchst. 2 50

Pachysandra

procumbens Michx. 1 50

Pæderota

Ageria L. 1 50
Bonarota L. 1 50
chamædrifolia Kœn. . . . 2 50
Churchilli Kern. 2 50
Zanichellii Brign. 2 50

Pæonia

albiflora Pall. 1 50
anomala L. 1 50
arietina Anders. 1 50
Broteri R. Br. 1 50
corallina Retz. . . . . . 1 —
dahurica Anders. 1 50
decora Anders. 1 50
humilis Retz. 1 50
lobata Desf. . . . . 1 —
Moutan Sims. 1 50
officinalis Retz . . . . . 1 —
paradoxa Anders. 1 50
peregrina Mill. . . . . . 1 —
pubens Sims. 1 50
Russi Bivon. 1 50
tenuifolia L. 1 50
— à fl. doubles . . . 1 50

Papaver

alpinum L. . . . . — 50
var. Burseri Crantz. . . . 1 —
var. Rheaticum Ler. . . . 1 50
alpinum à fleurs rouge cinabre, jaune d'ocre, jaune orangé, rose clair, etc. . 1 —

Le Pavot des Alpes est, de toutes les plantes de montagnes, l'une des plus gracieuses et des plus florifères. Il faut le considérer comme bisannuel en plaine, mais il se reproduit abondamment par graines. Il fleurit pendant tout l'été.

Atlanticum Ball. . . . . — 50

Bonne esp. à fl. rouge brique, fleurissant presque toute l'année. R.; s.

bracteatum Lindl. . . . . 1 —

Enorme pavot écarlate à placer dans un parterre. Mai-Juin.

caucasicum M. B. . . . . — 50
croceum Ledeb. . . . . . — 50
Heldreichii Boiss. . . . . — 50
Libanoticum Boiss. . . . — 50
microcarpum DC. 1 50
nudicaule L. . . . . — 50

Variétés à fleurs rouges et jaunes.

orientale L. . . . . . . — 50

L'une des bonnes pl. vivaces; grosses fleurs rouges; Mai-Juin; sol profond, s.

persicum Lindl. . . . . . — 50
pilosum Sibth. . . . . . . — 50
pyrenaicum Willd. . . . . — 50
rupifragum Boiss. . . . . — 50
spicatum Boiss. . . . . . — 50
strictum Boiss. . . . . . 1 —

Les Pavots vivaces sont très recommandables, soit pour leurs belles fleurs, soit pour leur abondance de floraison.

Paradisia

Liliastrum Bert. . . . . . — 50

Le Lys de St-Bruno est l'une des gloires des pentes ensoleillées de nos Alpes; c'est également une bonne et belle plante à placer dans les rochers au soleil, où elle fleurit en Mai. Bel épi de fleurs blanc pur à anthères d'or; parfum délicat.

Paris

quadrifolia L. (Ombre) . . — 50

Parnassia

palustris L. . . . . — 50

La Parnassie, dont les fleurs blanches égayent les lieux humides des montagnes de Juillet en Septembre, réussit bien dans nos jardins (r. ou pl. t.) à la condition de lui donner un sol humide ou frais.

Paronychia

argentea Lam. — 50
capitata Lam. — 50
Kapella Kern. 1 50
Kotschyana Boiss. 1 50
Kurdica Boiss. 1 50
polygonifolia DC — 50
aurantiaca Hort. Pan. — 75
serpyllifolia DC — 50

Pellaea (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Penthorum

Sedoides L. 1 —

Pentastemon

Barbatum Nutt. (Chelone barb.) — 50
campanulatum Willd. — 50
Cobaea Nutt. 1 —
cœruleum Nutt. — 50
confertum Dougl. — 50
diffusum Dougl. — 50
digitalis Nutt. — 50
frutescens Lamb. — 50
gentianoides Poir. — 50
Jeffrayanus Hook. — 50
ovatum Dougl. — 50
pubescens Sol. — 50
Richardsonni Dougl. — 50
speciosum Dougl. — 50
Torreyi Gray. — 50

Petasites

albus Gaert. — 50
niveus Cass. — 50
officinalis Mœnch. — 50
Reuterianus Jord. 1 —

Plantes propres aux endroits frais et humides; feuillage très grand, ornemental.

Peucedanum

Sibiricum Willd. — 50

Petrocoptis Lagascæ (V. Lychnis).

Petrocallis

pyrenaica R. Br. 1 —

Joli Draba à fleurs rose pâle. R. mi-s.

Phaca

alpina Jacq. 1 —
astragalina DC 1 —
australis L. 1 —

Jolis arbustes (Papilionacées) à placer dans les rochers.

Phalangium

Nepalense Lindl. 1 50

Phegopteris (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Phlomis

armeniaca Willd. — 50
canariensis Webb. — 50
Cashmeriana Royle 1 50
chrysophylla Boiss. 1 50
fruticosa L. 1 —
Samia L. — 50

Labiées à grandes formes architecturales, à fl. jaunes ou roses, à placer dans les endroits chauds et abrités des grands rochers ou de la pl. terre; le Phl. Samia est l'une des plus ornementales et des meilleures plantes vivaces; feuilles velues-veloutées; fleurs jaune orangé et pâle, en verticilles autour d'une tige haute d'un mètre. Juin-Juillet.

Phlox

acuminata Pursh. (decussata) — 50
amœna Sims. — 50
canadensis Sweet. (divaricata) — 50
carolina L. 1 —
glaberrima L. 1 —
nivalis Sweet. — 50
ovata L. — 50
reptans Mich. — 50
» var. « Vivid » 1 50
setacea L. — 50
» à fleurs blanches — 50
Stellaria — 50
subulata L. — 50
» Nelsoni Hort. — 50
verna Swett. — 50

Les Phlox nains et rampants sont excellents pour la confection des bordures et l'ornementation des rochers; s.; Mai-Juin.

Phygelius

capensis F. Mey. 1 —

Physalis

alkekengi L. 1 50

Solanée fort curieuse, excellente pour l'ornementation des gros rochers et des jardins au s. ou mi-s.; elle est très traçante, envahit rapidement l'emplacement et porte, en automne, des fruits curieux consistant en une baie rouge (petite Tomate) entourée d'une large vésicule ou Lanterne vénitienne, d'un rouge brique très vif; ces vésicules se maintiennent pen-

Physalis *(suite)*.

dant tout l'hiver et sont l'une des plus gracieuses décorations hivernales de nos jardins ou de nos appartements, car elles font merveille dans les bouquets secs. La baie du Physalis est, en outre, très recherchée des merles.

Physostegia

virginica Benth. . . . . — 50

Bonne plante vivace à fleurs lilas, haute de 1-2 mètres et fleurissant d'Août en Octobre.

Phyteuma

1 austriaca Beck. 2 50
2 betonicæfolium Vill. . . — 50
3 campanuloides Bieb. . . — 50
4 canescens W. K. . . . — 50
5 Charmelli Vill. . . . . — 50
6 Comosum L. . . . . . 4 —
7 Halleri All. . . . . . 1 —
8 hemisphæricum L. . . . 1 —
9 humile Schl. 2 50
10 limonifolium Sibt. et Sm. — 50
11 Michelii All. . . . . . 1 —
12 nigrum Schmidt. . . . . 1 —
13 obtusifolium Freyn. . . . 1 50
14 orbiculare L. . . . . . — 50
15 pauciflorum L. 2 50
16 Scheuchzeri All. . . . 1 —
17 spicatum L. . . . . . — 50
18 virgatum Willd. 1 50

Ces gracieuses Campanulées sont fort différentes de nature et d'aspect. Les nos 1, 2, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 sont des plantes de roc. auxquelles on donnera de petites niches sèches au s.; nos 6 et 9 exigent une fente de rocher et le plein soleil; les autres espèces réussiront dans un sol léger et poreux, nourrissant et frais, au s. ou mi-s. Tous, sauf no 17, sont à fl. bleues.

Pinguicula

alpina L. . . . . — 50
grandiflora Lam. . . . . 1 —
longifolia DC. . . . . . 1 —
Reuteri Genty 2 50
vulgaris L. . . . . . . — 50

Les Grassètes se cultivent dans de la mousse et de la terre de bruyère bien imprégnées d'eau.

Pinus

abies L. . . . . 1 —
cembro L. (Arole) . . . . 1 —
mughus Scop. 2 50
picea L. . . . . 1 —
pinea L. 2 50
Pumilio Hænke 2 50

C'est le joli Pin nain et rabougri du sommet du Reculet.

pyrenaica Lap. 2 50
Sabiniana Dougl. 1 50
sylvestris L. . . . . . . 1 —
uncinata Ram. 2 50

Plantago

alpina L. . . . . — 50
cynops L. . . . . — 50
montana L. . . . . . . — 50

Platanthera (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Platycodon

autumnale Dcsne. . . . . — 50
grandiflora DC. . . . . . — 50
» à fl. blanches . . . . 1 —
Mariesi Hort. . . . . . 1 —
nanum Hort. . . . . . . 1 —

Très belles Campanulées à très grandes fleurs, constituant l'un des plus riches ornements des plates-bandes et rochers pendant les mois de Juillet à Septembre. Excellentes pour la fleur coupée. Bon sol profond; s.

Platyloma (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Plumbago

Larpentæ Lindl. . . . . . — 50

L'une des plus jolies d'entre les fleurs bleues (corolle bleu de Prusse) se succédant pendant tout l'automne; pl. t. ou r.; o. ou mi-s. Pl. très robuste et rustique, recommandable.

Podophyllum

Emodi Wallr. 1 50
peltatum L. 1 50

Polemonium

boreale Adams. . . . . . 1 —
campanulatum Th. Fr. . . 1 50
cœruleum L. . . . . . . — 50
» à fl. blanches . . . . — 50
» grandiflorum . . . . — 50
» piliferum . . . . . — 50

Polemonium (*suite*).

dissectum Reich. — 50
flavum Grene (à fl. jaunes). 1 —
gracile Willd. — 50
Himalayense Baker — 50
humilis Rgl. 1 —

Jolie pl. absolument naine, propre à garnir une niche au mi-soleil.

mexicanum Cerv. — 50
pauciflorum Wats. — 50
pulchellum Bunge. — 50
reptans L. — 50
Richardsonni Grah. 1 50
— à fl. blanches. 1 50

Bonnes pl. vivaces pour la fl. coupée ou l'ornementation des rochers et plates-bandes. Mai-Juillet.

Polychemone

nivalis Schott. 2 50

Polygala

chamæbuxus L. 1 —
atropurpureus. 2 50

Polygonatum

bracteatum Dietr. — 50
biflorum Darl. — 50
Japonicum Morr. 1 —
giganteum O. et D. 1 —
multiflorum Desf. — 50
roseum Ledeb. 1 —
verticillatum Desf. — 50
vulgare Desf. — 50

Les différents Sceaux de Salomon sont de bonnes plantes ornementales pour les sous-bois ou les lieux ombragés des r. ou pl.-bandes.

Polygonum

amplexicaule L. — 50
affine Don. — 50
Bistorta L. — 50
Brunonis Wall. — 50
capitatum Don. 1 50
cuspidatum Willd. — 50
molle Don. — 50
Sacchalinense Schmidt. 1 —
vacciniifolium Wall. 2 50
viviparum L. — 50

Les Renouées ou Persicaires sont de bonnes plantes d'ornementation pour les jardins. P. cuspidatum et Sacchalinense, surtout cette dernière, sont des pl. très envahissantes et aux formes gigantesques, propres à orner les lieux sauvages et arides des campagnes; P. molle est une très jolie fleur de l'arrière-automne très bonne pour la confection des bouquets, très élégante, d'un bleu très pur et portée par des tiges de 1 à 1 m. 50 de haut.

Polypodium (Voir Catal. Foug. et Orchid. rust.)

Polystichum (Idem.)

Potentilla

alba L. — 50
alchemilloides Lap. — 50
ambigua Gaud. — 50
arachnoidea Dougl. — 50
argentea L. — 50
argyrophylla Wall. — 50
astrakanica Jacq. — 50
atrosanguinea Don. — 50
Baldensis Kern. 1 —
Buccoana Clem. — 50
aurea L. — 50
Bohemica Brk. — 50
Calabra Ten. — 50
caulescens L. — 50
Chinensis Ser. — 50
Chrysantha Trev. — 50
Clusiana Jacq. 1 50
cuneata Wall. — 50
dealbata Bunge. — 50
Fenzlii Lehm. — 50
fragiformis Willd. — 50
frigida Vill. — 50
fruticosa L. 1 —

Potentille arborescente, autrefois abondante en Suisse, actuellement disparue de notre territoire.

fulgens Wall. 2 50
Gaudini Grem. — 50
gelida C. A. M. — 50
glandulosa Lindl. — 50
grandiflora L. — 50
Hippiana Lehm. — 50
Hoopwoodiana Sweet. 1 —
Kurdica Boiss. — 50
Lindackeri Tausch. — 50
minima Hall. — 50
multifida L. — 50
micrantha Ram. — 50
mollis Pant. — 50
Nepalensis Hook. — 50

L'une des plus jolies; fleurs d'un rose vif.

Potentilla (*suite*).

nitida L.	1	—
nivea L.	—	50
opaca L.	—	50
pedaemontana Reut.	1	—
Pensylvanica L.	—	50
petiolata Gaud.	—	50
pygmæa Jord.	2	50
pyrenaica Willd.	—	50
recta L.	—	50
rupestris L.	—	50
Sabauda DC	—	50
speciosa Willd.	—	50
splendens Ram.	—	50
Tormentilla Schr.	—	50
tridentata Sol.	—	50
villosa Crantz	—	50
Visiani Panc.	1	—

Toutes ces Potentilles sont des plantes florifères à fleurs jaunes, blanches, roses ou rouge vif très recommandables pour la décoration des rochers ou des plates-bandes.

Poterium

muricatum Spach.	—	50
rupicolum Boiss.	—	50

Prenanthes

purpurea L.	—	50

Bonne plante pour les sous-bois.

Primula (Primevères).

(Section Auricula).

1	Allionii Lois.	2	50
2	auricula L.	—	50
	Balbisii Lehm. (V. P. ciliata).		
3	Bellunensis Kern.	2	50
4	biflora Hut.	2	50
	calycina Reich. (V. P. spectabilis).		
5	carniolica Jacq. (multiceps Freyh.).	1	50
6	ciliata Moretti.	2	50
7	Clusiana Tausch.	1	50
8	commutata Schott.	2	50
9	confinis Schott.	2	50
10	Cottia Widm.	2	50
	crenata Lam. (V. P. marginata).		
	daonensis Leyb. (V. P. œnensis).		
11	discolor Leyb.	2	50
12	Facchini Schott.	2	50
13	Flœrkeana Salz. (P. intermedia Portensch)	2	50
14	Göblii Kern.	5	—
15	glutinosa Wulf.	2	50
	graveolens Heg. (V. P. viscosa).		

Primula (*suite*).

16	Heerii Brüg.	5	—
17	hirsuta All.	2	50
18	integrifolia L. (P. Candolleana Reich.).	1	50
19	Kitaibeliana Schott.	5	—
20	latifolia Lap.	2	50
21	marginata Curt.	2	50
22	minima L.	1	50
23	Muretiana Kern.	2	50
24	nivea Hort.	2	50
25	Obristii Stein.	5	—
26	Oenensis Thom. (P. daonensis Leyb.)	2	50
27	Palinuri Petag.	2	50
28	pedemontana Thom.	2	50
29	Portæ Hut.	5	—
30	pubescens Jacq.	1	50
31	Rhætica Gaud.	5	—
32	spectabilis Tratt. (P calycina).	2	50
33	Tyrolensis Schott.	2	50
34	venusta Host.	2	50
35	villosa Jacq.	2	50
36	viscosa All.	1	—
	» major.	2	50
	» minor	2	50
37	Wulfeniana Schott.	2	50

Les Primevères de ce groupe appartiennent toutes à la chaîne des Alpes et à celle des Pyrénées. Ce sont pour la plupart des plantes saxatiles et qui aiment les fentes des rochers et la position perpendiculaire. Sont dans ce cas les nos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 37 dont les fleurs sont d'un rose pourpre plus ou moins foncé, blanc chez no 24 et qui toutes redoutent le trop grand soleil, et les nos 2, 6, 14 et 27, à fleurs d'un beau jaune répandant un doux parfum, et qui, elles, exigent le soleil. Les nos 4, 12, 13, 15, 17, 52 et 33, préfèrent une niche au mi-soleil avec un sol poreux, frais et bien drainé pourtant. Toutes fleurissent à partir de Mars en Mai, et sont de gracieuses et précieuses plantes de rocailles.

Section Auriculatae.

Primula

algida Adams	1	50
auriculata Lam.	1	50
luteola Rupr.	1	50
rosea Royle	1	—
» grandiflora Leicht.	1	50

Un sol frais et poreux, une exposition au levant et au couchant convien-

nent à ces plantes qui fleurissent de Mars en Mai et réussissent dans une niche de la rocaille comme en pleine terre. Le P. rosea est l'une des plus brillantes espèces du genre et ne doit manquer dans aucun jardin.

Section Capitatae.

Primula

capitata Hook. 1 50
Cashmeriana Hook. . . . — 50
denticulata Sm. . . . . — 50
» à fl. blanches 2 50
erosa Wall. 2 50

Une bonne terre poreuse, une grosse niche au mi-soleil, un emplacement frais ou bien la pleine terre, conviennent à ce groupe. Ce sont de bonnes plantes florifères (P. capitata le plus beau de tous, est délicat et craint la trop grande humidité comme aussi le sec) qui portent une infinité de fleurs lilas ou violet très foncé en un capitule terminal, de Mars en Juin.

Section Cordifolia.

Primula

grandis Trautv. 1 50

Belle plante à fleurs jaunes ou rose clair, qui croît dans les lieux humides du Caucase occidental, entre 2,000 et 3,300 m., et réussit fort bien dans un sol poreux au mi-soleil.

Section Farinosae.

Primula

farinosa L. . . . . . . — 50
Finnmarchica Jacq. . . . 2 50
involucrata Wall. 1 50
longiflora All. 1 50
Magellanica Lehm. . . . 1 50
mistassinica Pax. 2 50
Munroi Lindl. 1 50
Olgæ Rgl. 1 50
Scotica Hook. 1 50
Sibirica Jacq. 2 50
stricta Horn. 2 50
Warei Stein. 1 50

Ce groupe comprend de jolies espèces à fl. roses ou blanches qui préfèrent les sols marécageux et tourbeux, les lieux frais et mi-ombragés des roc. ou de la plate-bande. Elles fleurissent de Mai en Juillet, suivant l'espèce.

Section Floribundæ

Primula

Boveana Dcsne. 1 50

Primula (*suite*).

floribunda Wall. 1 50
verticillata Forsk. 1 50

Joli groupe à fleurs jaunes réunies en verticilles étagés les uns sur les autres; ils résistent mal à nos hivers et exigent une couverture. Dans une serre froide le P. floribunda fleurit durant tout l'hiver.

Section Nivales.

Primula

Sikkimensis Hook. 1 50

Belle espèce himalayenne à feuillage sombre et dentelé, à grandes fleurs jaune soufre, tubulées et retombant en forme de cloche d'une grappe terminale qui s'épanouit de Mai en Juin. R. ou pl. t.; sol tourbeux ou frais; mi-s.

Section Proliferae.

Primula

Japonica A. Gray. . . . . — 50
» var. à fl. blanches ou jaunes ou lilas clair . . 1 —
Poissoni Franchet 1 50

Jolies fleurs réunies en verticilles superposés et étagés les uns au-dessus des autres; le type du P. Japonica à fl. rose carmin très vif est très remarquable. Cult. du P. Sikkimensis.

Section Sinenses.

Primula

cortusoides L. . . . . . — 50
mollis Hook. 2 50
obconica Hance. . . . . — 50
Sieboldi Morren . . . . . 1 —
— alba . . . . . . 1 —
amœna . . . . . 1 —
— fimbriata . . . . 1 —
— grandiflora . . . . 1 —
— lilacina . . . . . 1 —

Cette section renferme des espèces à feuilles cordiformes, largement pétiolées et a ses fleurs réunies en grappes au sommet des tiges. Ce sont de jolies espèces à fl. rose carmin plus ou moins vif (blanc-bleuâtre chez le P. obconita); les variétés du Pr. Sieboldi sont de toute beauté; mi-o.; sol frais; r. ou pl. t. Avril-Mai.

Section Vernales.

Primula

acaulis Jacq. . . . . . . — 50
— var. genuina Pat. . . 1 —
— à fl. blanches . . . — 50

Primula (*suite*).

acaulis à fl. roses . . . . — 50
— à fl. pourpre foncé. — 50
— à fl. doubles . . . — 50
— bleu grisâtre . . 1 50
carpathica Fuss. . . . . — 50
Columnæ Pax (suaveolens) . — 50
elatior Jacq. . . . . . . — 50
inflata Lehm. . . . . . . — 50
inbricata Gr. Godr. . . . . — 50
macrocalyx Bunge. . . . — 50
monstrosa Hort. . . . . . — 50
— à fl. pourpre . . . — 50
officinalis Jacq. . . . . . — 50
— à fl. rouge vif. . . . — 50

Les esp. de ce groupe sont de culture aisée; elles se plaisent dans toute bonne terre un peu légère, au mi-soleil et recherchent plutôt le frais que le sec. R. ou pl. t. On en fait de beaux tapis dans les sous-bois et des bordures de plates-bandes qui, au premier printemps, font un bel effet. On les utilise encore pour émailler les pelouses et gazons.

Prunella

grandiflora L. . . . . . . — 50
laciniata L. . . . . — 50

Pteris (Voir Catal. des Foug. et Orch. rustiq.)

Pterocephalus

Parnassi Sprgl. . . . . . 1 —

Pulmonaria

mollis Wulf. . . . . . . — 50
montana Lej. 1 50
officinalis L. . . . . . . — 50
tuberosa Schrank. 1 50

Puschkinia

libanotica Zuw. 1 50
scilloides Adams. 1 50

Pyrethrum

carneum Bieb. . . . . . — 50
caucasicum Willd. . . . — 50
parthenifolium Willd. . . — 50
Tschithatscheffi Boiss. . . — 50

Pyrola

chlorantha Sw. 2 50
media Sw. 2 50
minor L. 1 50

Pyrola (*suite*).

rotundifolia L. . . . . . . 1 —
secunda L. . . . . 1 —
umbellata L. 2 50
uniflora L. 2 50

Les Pyroles sont des pl. d'ombre et croissant habituellement sous bois; leur feuillage beau et luisant, leurs fleurs gracieuses, leur port si original, en font les favorites des botanistes et des amateurs. Le P. uniflora, par ses larges corolles d'un blanc de cire et le parfum très délicat qui s'en échappe (plus doux et plus délicieux que celui des fleurs d'oranger) mérite une place dans tous les jardins. O.; fraîcheur; sol composé de mousse et de terre franche avec un peu de sable.

Ramondia

pyrenaica Rich. . . . . . — 50
— major Hork. . . . 1 —

Plante belle et curieuse. R. humides et ombragés. Mai-Juin.

Ranunculus

1 aconitifolius L. . . . . . — 50
— à fleurs doubles. . 1 —
2 alpestris L. . . . . — 50
3 amplexicaulis L. . . . . 1 —
4 anemonoides Zahl. . . . 2 50
5 bilobus Bert. 1 50
6 bullatus L. 2 50
7 crenatus W. et K. . . . 1 50
8 creticus L. 2 50
9 glacialis L. . . . . 1 —
10 graminæus L. . . . . . — 50
11 Illyricus L. . . . . 1 —
12 Lingua L. (aquatique). . — 50
13 macrophyllus Desf. . . . — 50
14 montanus Willd. . . . . — 50
15 millæfoliatus Wahl. . . . — 50
16 parnassifolius L. . . . . 1 —
17 platanifolius L. . . . . — 50
18 pygmæus Wahl. 2 50
19 pyrenæus L. . . . . . . — 50
20 rutæfolius L. . . . . . . 1 —
21 Seguieri Vill. . . . . . . 1 —
22 Thora L. . . . . — 50
23 Traunfellneri Hoppe. . . 2 50
24 Villarsi DC. . . . . — 50

Les nos 2, 3, 4, 5, 7, 16, 20, 22 et 23 sont des Renoncules à fl. blanches ou roses, à floraison printanière, de

taille basse et touffue, qui recherchent le sol frais et poreux aussi bien que le plein soleil. On leur donnera une niche bien drainée, le levant ou le couchant et un sol composé de 1/3 terre de bruyère, 1/3 terre franche, 1/3 sable avec adjonction de cailloux concassés; les nos 1 et 17 sont des pl. à tiges élevées, de 50 cm. à 1 m., portant de nombreuses fl. blanches en Mai-Juin et qui recherchent le mi-ombre et la fraîcheur du sol; nos 6, 8, 15 et 22 sont des esp. bulbeuses qui portent des fl. jaunes et demandent, à l'instar des bulbes, une époque de repos après leur floraison; ils veulent le sec et le plein soleil dans la rocaille ou la plate-bande; no 18 est une toute petite espèce tyrolienne qui réclame une niche sèche dans la rocaille. Les autres espèces sont à fleurs jaunes et recherchent le soleil.

Reseda

complicata Bory	—	50
glauca L.	—	50

Rhamnus

alpina L.	1	—
pumila Turr.	2	50

Rhaponticum

cynarioides Less.	—	50
pulchrum Fisch. et Mey.	1	—
scariosum Lem.	—	50

Rheum

Emodi Wall.	1	50
nobile Hook.	5	—
palmatum L.	1	—
— Tanguticum Regl.	1	—
undulatum Lam.	1	—

Les Rhubarbes d'ornement, surtout le R. palmatum, sont de belles pl. à isoler dans les parterres ou à placer dans les grands rochers.

Rhodiola

linifolia DC.	—	50
rosea L.	—	50
rubra Rgl.	1	50

Pl. très voisines des Sedum; le R. rubra forme une belle touffe naine à fl. d'un rouge vermillon (Mai-Juin), tandis que le R. rosea, avec son feuillage glauque, ressemblant aux Euphorbes méridionaux, fait contraste avec la verdure des autres pl. alpines. R.; mi-s. ou s.

Rhododendron

chamæcistus L. Le beau et curieux Rhodod. du Tyrol	5	—
ferrugineum L. (Rose des Alpes). Exemplaires de 10 ans, couverts de boutons	5	—
— jeunes pieds de 2 et 3 ans	1	50
hirsutum L. couvert de boutons (pieds de 10 ans(	5	—
— jeunes pieds de 2 et 3 ans	1	50
punctatum Andr. forts	5	—

Les Roses des Alpes demandent un sol léger; si possible terre de bruyère ou tourbe; celles que nous offrons sont de gentils petits arbrisseaux de 0.40 à 0.50 cent. de haut et boutonnés. Ils ont été élevés de semis en plaine et leur réussite dans les jardins est assurée.

Rhus

Coriaria L.	1	—
Toxicodendron L.	1	—

Rhyzobothria

alpina Tausch.	1	50

Ribes

alpinum L.	1	—
aureum Pursch.	1	—
niveum Lindl.	1	—
petræum L.	1	—
saxatile Pall.	1	—

Rodgersia

podophylla A. Gray.	1	50

Romanzoffia

Sitchensis Chm.	1	50

Romulea

Bulbocodium Seb.	2	50
crocifolia Vis.	1	50

Rosa

alpina L.	—	50

Eglantine pourpre des Alpes sans épines.

alpina var. pyrenaica Gouan	—	50
Banksiæ R. Br. à fl. simples	2	50
berberidifolia Pall.	2	50
cinnamomea L.	1	50
Eglanteria L.	2	50
pomifera Herm.	1	—

Rosa (*suite*).

pimpinellifolia DC.	—	50
rubiginosa L.	1	—
rugosa Thunb.	—	50

Rubus

articus L.	1	—
— folcundus Rgl.	1	50

La Ronce arctique est un gracieux petit arbuste à fleur rose vif et à fruits délicieux dont les Norvégiens et septentrionaux font d'excellentes confitures. Le feuillage rougit à l'automne comme celui de la vigne de Canada.

saxatilis L.	—	50

Rudbeckia

digitata Mill.	—	50
fulgida Ait.	—	50
hirta L.	—	50
laciniata L.	—	50
purpurea L.	1	—
speciosa Wend.	—	50

Les Rudbeckia sont de belles plantes vivaces à longue floraison (Juin-Octobre), de la famille des Composées, à belles grandes fl. jaunes à centre noir ou brun foncé, ou rougeâtres à centre plus foncé. Pl. t. Bonnes fl. à couper.

Ruscus

aculeatus L.	—	50
Hyppoglossum L.	1	50
racemosus L.	—	50

Ruta

graveolens L.	—	50
macrophylla Ker.	—	50
montana L.	—	50

Sagina

Linnæi Presl.	—	50
procumbens L.	—	50

Salix

glabra Scop.	1	—
glauca L.	1	—
Herbacea L.	1	—
Helveticum Vill.	1	—
reticulata L.	1	—
retusa L.	1	—
serpyllifolia Scop.	1	—

Les Saules des Alpes sont de tous petits arbrisseaux rampant sur le sol et qui font merveille dans les rocailles ; mi-s.

Salvia

austriaca L.	—	50
glutinosa L.	—	50
officinalis L.	—	50
pratensis L.	—	50
— alba.	1	50
Sclarea L.	—	50
sylvestris L.	—	50

Sambucus

canadensis L.	1	—
racemosa L.	1	—

Samolus

floribundus Kunth.	—	50
Valerandi L.	—	50

Sanguinaria

canadensis L.	1	—

Belle pl. haute de 25-20cm, à larges f. glaucescentes et gracieusement découpées-dentées et émettant en Mars-Avril de belles grandes fl. blanc pur ressemblant à des Anémones. R. ou pl. t.; mi-s.

Sanguisorba

Canadensis L.	—	50
carnea Fish.	—	50
media L.	—	50
officinalis L.	—	50
sitchensis C. A. M.	—	50

Sanicula

europæa L.	—	50

Santolina

chamæcyparissus L.	—	50

Saponaria

bellidifolia Sm.	—	50
cæspitosa L.	1	—
lutea L.	2	50
officinalis L. à fl. doubles	—	50
ocymoides L.	—	50

Charmant gazon rose, très propre à garnir les endroits arides et secs et les fentes des murs exposés au soleil. Le S. lutea est une belle et curieuse plante des pâturages élevés du Piémont, formant, comme sa congénère S. cœspitosa, des touffes serrées et compactes, mais émettant au lieu des fleurs roses de celle-ci, de jolies capitules de fl. jaune pâle avec anthères noirâtres. R., s. Mai-Juin.

Sarothamnus

Scoparius Willd.	1	50

Satureya

diffusa Boiss.	—	50
Illyrica Host.	—	50
intermedia C. A. M.	—	50
montana L.	—	50
pygmæa Sieb.	—	50
rupestris Wulf.	—	50

Charmants petits arbrisseaux nains et rampants, à feuillage odorant, et fleurissant à l'arrière-automne.

Saussurea

albescens Hook.	1	50
alpina DC.	1	50
crassifolia DC.	1	50
decurrens C. Wink.	1	—
depressa Gren.	1	50
discolor DC.	1	50
hypoleuca Spr.	1	50
nigrescens Maxim.	1	—
pygmæa Spr.	1	50
sordida	2	50

Saxifraga

Section Bergenia Mœnch ou Megasea Haw.

ciliata Wall.	1	—
cordifolia Haw.	1	—
crassifolia Haw.	1	—
ligulata Wall.	1	—
Milesii Baker.	2	50
purpurascens Hook. fil.	1	—
speciosa Hort. Leichtlin.	2	50
Stracheyi Hook fil.	1	—
Thysanodes Lindl.	2	50

Cette section renferme des espèces à larges feuilles, épaisses, souvent luisantes et poilues sur les bords. Leurs fleurs sont généralement rose vif, ramassées en grappes serrées et apparaissant chez plusieurs espèces de très bonne heure au printemps. On les traite comme les plantes vivaces de pleine terre.

Section Boraphyla:

Saxifraga

1 Clusii Gouan.	2	50
2 Hieracifolia L.	1	50
3 nivalis L.	1	—
4 pensylvanica L.	1	50
5 stellaris L.	1	—
6 Virginiensis Mich.	1	—

Ce groupe comprend des espèces qui aiment la fraîcheur et l'humidité. R.; mi-s. Les nos 1 et 5 sont des plantes des Hautes Alpes croissant près des sources et ne s'élevant pas à plus de 5 ou 10 cm.; les nos 3 et 5 sont des plantes du nord, à f. épaisses et spatulées, à petites fl. d'un blanc rougeâtre; nos 2 et 4 sont des espèces curieuses, à f. entières et allongées, à fleurs rougeâtres. Avril-Mai.

Section Cymbalaria :

Saxifraga

Cymbalaria L.	—	50
Huettiana Boiss.	—	50

Petites pl. annuelles ou bisanuelles à fleurs nombreuses, d'un jaune vif, à feuillage luisant et gai, formant de petites touffes très élégantes qui fleurissent de Mai en Automne. R. ou vieux murs; o. et fraîcheur,

Section Dactyloides ;

Saxifraga

ajugæfolia L.	1	—
Allionii Gaud.	1	—
Androsacea L.	1	—
aphylla Sternb.	1	—
aquatica Lap.	1	50
atropurpurea Sternb.	1	—
cæspitosa L.	—	50
Camposii Boiss. et Reut.	1	—
canaliculata Boiss. et Reut.	—	50
cantabrica Boiss. et Reut.	—	50
capitata Lap.	1	—
citrina Heg.	2	50
conifera Coss. et Dur.	1	50
crocea Gaud.	2	50
cuneata Willd.	5	—
exarata Vill.	—	50
Facchini Koch.	1	—
geranioides L.	—	50
Gibraltarica Boiss. et Reut.	1	50
globulifera Desf.	1	50
Grœnlandica L.	1	—
hibernica Harv.	1	—
hypnoides L.	—	50
intricata Lap.	1	—
Iratiana Schultz.	1	—
laevis Mack.	1	—
laxa Sternb. (Rhei.).	1	50
moschata Wulf.	1	—
Mureti Rambert	2	50
muscoides All.	—	50
nervosa Lap.	1	—
pedemontana All.	2	50
perdurans Kit.	1	50

Saxifraga (*suite*).

pygmæa Haw. 1 50
quinquefida Haw. (Sponhemica) . — 50
Sedoides L. 2 50
Seguieri Sprgl. 1 50
varians Sieb. . . . . . — 50
Wettsteinii Brüg. 2 50

Les plantes de cette section sont des espèces moussues et cespiteuses, à rameaux étalés sur le sol qu'ils recouvrent à la manière des mousses; feuillage finement divisé; fleurs blanches ou roses. R. ou pl. t.; o. ou mi-soleil. Excellentes pour bordures. Mai-Juin.

Section Diptera.

Saxifraga

cortusaefolia S. et Z. . . . 5 —
cuscutaeformis Lodd. . . . 2 50
Fortunei Hook. 1 50
Japonica Sieb. . . . . . 1 —
Sarmentosa S. et Z. . . . — 50

Ces espèces sont toutes chinoises ou japonaises. Toutes, sauf S. Fortunei, présentent le port de plantes sarmenteuses, tombantes, formant de longs filaments grêles au bout desquels se développent de nouvelles plantes qui donnent à leur tour d'autres filaments et ainsi de suite. Elles sont rustiques sous notre climat, mais demandent pourtant une position abritée.

Section Euaizoonia.

Saxifraga

aizoon Jacq. . . . . . . — 50
— brevifolia Rgl. . . . — 50
— Churchilli Hut. . . . — 50
— dubia Hort. . . . . — 50
— Malyi Schott. . . . . — 50
— minor Hort. Corr. . . — 50
— robusta Belv. . . . . — 50
altissima Kern. . . . . . — 50
Andrewsi Haw. . . . . . — 50
australis Moric. . . . . . 1 —
carinthiaca Schott. . . . . 1 —
carniolica Huter. . . . . . 1 —
cartilaginea Willd. . . . . 1 —
catalaunica Boiss. . . . . 1 —
cochlearis Reich. . . . . . 1 —
— minor Hort. 2 50
cotyledon L. . . . . — 50

Devient superbe dans les fentes des rochers et des vieilles murailles.

crustata Vest. . . . . . 1 —
cultrata Schott. . . . . . 1 —
elatior M. et K. . . . . . — 50
Gaudini Brügger . . . . 1 —
Hostii Tausch. . . . . . — 50
intacta Willd. . . . . . — 50
Kolenatiana Regel. . . . . 1 —
Lantoscana Boiss. et Reut. . 1 —
La Graveana Hort. . . . . 1 —
lingulata Bell. . . . . . 1 —
longifolia Lap. . . . . . 1 —

La Reine des Saxifrages. Elle demande une position verticale entre les pierres d'une rocaille ou dans un vieux mur.

longifolia major. 2 50
longifolia-cotyledon. . . . 2 50
longifolia-cochlearis Cor. . 2 50
Montavoniensis Kern. . . 1 50
mutata L. . . . . — 50
notata Schott. . . . . . — 50
pectinata Scht. . . . . . — 50
Portae Stein. . . . . . — 50
pyramidalis Ten. . . . . 1 —
pyrenaica Lap. . . . . . 1 —
robusta Schott. . . . . . 1 —
rosularis Schleich. . . . 1 —
sempervivum Koch. . . . 1 —
Stabiana Boiss. . . . . . — 50
sturmiana Schott. . . . . — 50
Zeleborii Schott. 1 50

Toutes ces plantes sont propres aux lieux rocheux et ensoleillés des montagnes de l'Europe; leur feuillage, durci par la chaleur, crustacé, d'un vert grisâtre, souvent recouvert d'une poussière blanchâtre, offre un aspect très particulier et une grande résistance qui permet de les considérer comme des plantes très robustes. Elles aiment le soleil et le rocher; le P. mutata seul recherche un sol frais, et, tandis que les fleurs des autres espèces sont blanches, souvent pointillées de pourpre, celles-ci sont d'un rouge brun vif. Mai-Août.

Section Hirculus.

Saxifraga

diversifolia Wall. 2 50
Hirculus L. 1 50
— grandiflora Rgl. . . . 2 50

Plantes marécageuses aimant la tourbe et les lieux frais et mi-ombragés; fleurs rouge orangé; Mai-Juillet.

Section Isomeria.

Saxifraga

aconitifolia F. et G. . . . 1 50

R.; lieux frais et mi-ombragés; fleurs blanches. Mai-Juin.

Section Kabschia.

Saxifraga

aretioides Lap. 1 50
aretioides×media Benth. . . 2 50
Burseriana L. 1 50

L'un des plus gracieux du genre; fl. grandes et blanc pur, apparaissant en Mars.

caesia L. 1 50
calyciflora Lap. (V. media).
diapensioides Bell. . . . 2 50
Friederici Augusti Bias. . . 2 50
imbricata Royle 2 50
juniperifolia Adams. . . . 1 50
Kotschyi Boiss. 2 50
luteo-viridis Schott. et Kot. . 2 50
marginata Sternb. . . . 2 50
media Gouan. 2 50
patens Gaud. 2 50
Rocheliana Sternb. . . . 2 50
sancta Gris. . . . . . 1 —
scardica Gris. . . . . . 5 —
squarrosa Sieb. 1 50
Tombeanensis Boiss. . . . 1 50
Valdensis DC. 2 50
Vandelli Sternb. 1 50

C'est ici la plus jolie, la plus intéressante section du genre; les espèces qui la composent forment toutes de petites touffes en boule ou en pelotes, à feuillage serré, composées d'une infinité de petites rosettes serrées les unes contre les autres, et émettant au printemps (de Mars en Juin suivant les espèces) un grand nombre de fleurs blanches ou jaunes. R.; s.

Section Miscopetalum.

Saxifraga

angulosa Schott. . . . . 1 —
circinata Hort. . . . . 1 —
glandulosa Griseb. . . . 1 —
Græca Boiss. et Held. . . 1 —
Heucherifolia Griseb. . . 1 —
lasiophylla Schott. . . . — 50
Melliana Boiss. . . . . 1 —
repanda Willd. . . . . — 50
rotundifolia L. . . . . — 50
Taygetæa Boiss. et Held. . 1 —

Ces Saxifrages ont les feuilles généralement orbiculaires, dentées sur les bords, et émettant des fleurs blanches souvent ponctuées de pourpre et disposées sur des tiges paniculées, hautes de 10 à 80 cm suivant les espèces. R. ou pl. t.; fraîcheur et mi-o. Mai-Juin.

Section Nephrophyllum.

Saxifraga

arachnoidea Sternb. . . . 5 —
biternata Boiss. 1 50
bulbifera L. . . . . . . — 50
carpathica Reich. . . . 2 50
cernua L. 1 50
granulata L. . . . . . — 50
— à fl. doubles . . . 1 50
irrigua Bieb. . . . . . — 50
odontophylla Wall. . . . 2 50
rivularis L. 1 50
sibirica L. 2 50

Les espèces de ce groupe recherchent les positions humides ou les lieux frais; fl. blanches. R. ou pl. t.; mi-soleil. Mai-Juin.

Section Peltiphyllum.

Saxifraga

Peltata Torr. 1 50

Belle et grande espèce de Californie, à feuilles en parasol retourné, mesurant parfois 60 cm de diamètre, à fl. roses disposées en grappe au sommet d'une tige épaisse, charnue et garnie de poils bruns, haute de près d'un mètre. Sol profond et très poreux, frais et riche en humus. Mi-soleil. Juin-Juillet.

Section Porphyrion.

Saxifraga

biflora All. 1 50
blepharophylla Kern. . . 3 —
oppositifolia L. . . . . — 50
— à fleurs blanches . . 2 50
— grandiflora Engl. . . 1 50
pyrenaica Hort. 1 50
retusa Gouan. 2 50
Rudolphiana Horn. . . . 2 50

Les espèces de ce groupe sont très différentes des autres Saxifrages et beaucoup plus brillantes comme fleurs; ce sont des touffes naines et étalées sur le sol, formant des gazons plus ou moins épars et denses, se recouvrant en Mars-Avril-Mai de fleurs sessiles d'un rose vif, carmin foncé ou clair, ou rouge bri-

Saxifraga (*suite*).

que suivant les espèces, et produisant le plus charmant effet. Il leur faut le rocher et le nord-est ou le nord-ouest, ou bien encore une niche au levant. Culture relativement facile et floraison abondante et précoce. Elles sont l'un des plus précieux éléments de décoration des rochers alpins.

Section Robertsonia.

Saxifraga

apennina Bert. . . . . . — 50
cuneifolia L.. . . . . . — 50
Forsteri Stein. 1 50
Geum L. . . . . — 50
Melvillei Hort. 1 50
polita Link. . . . . . . — 50
serratifolia Mack. . . . . 1 —
umbrosa L. (London Praide) . . — 50

Bonnes plantes connues sous le nom de « Désespoir du peintre » à cause de la finesse de leurs fleurs blanches pointillées de pourpre et disposées en épis ou panicules dressés; feuillage très élégant. Excellentes pour bordures ou garnir les niches de roc. à l'ombre ou au mi-s. Mai-Juin.

Section Trachyphyllum.

Saxifraga

aspera L.. . . . . — 50
aizoides L. . . . . . . — 50
— atrorubens Bert. . . . 1 50
bronchialis L. . . . . . 1 —
bryoides L. . . . . . . — 50
elongata Gaud . . . . . 1 —
flagellaris Willd. 1 50
Haussmanni Kern. 1 50
Regelii Kern. 1 50
tenella Wulf. . . . . . 1 —
tricuspidata Retz. . . . . 1 —

Plantes cespiteuses formant des touffes, à feuilles velues-ciliées ou nues, à fl. blanches, jaunes ou rougeâtres, recherchant les sols humides et mi-ombragés; R. Mai-Août.

Section Tridactylides.

Saxifraga

adscendens L. . . . . . . — 50
Blavii Engl. . . . . . . — 50
controversa Sternb.. . . . — 50
Petræa L. . . . . — 50

Plantes annuelles ou bisannuelles à petites fleurs blanches; R.

Scabiosa

caucasica Bieb. . . . . . 1 —

Très belle espèce à grandes capitules bleu lilas. Juin-Septembre.

Correvoniana Lev. et Som.. 1 50

Nouvelle Scabieuse du Caucase à fleurs jaune soufre.

crenata Cyrill. . . . . . 1 —
graminifolia L. . . . . . — 50
lucida Vill. . . . . — 50
Silenifolia W. K. . . . . 1 —
vestina Fach. . . . . . . — 50

Schievereckia

podolica Andr. . . . . . — 50

Scilla

amœna L. . . . . — 50
autumnalis L. . . . . . — 50
bifolia L.. . . . . — 50
— à fl. roses . . . . . 1 —
— à fl. blanches . . . . 1 —
campanulata Ait. . . . . — 50
— à fl. blanches . . . . 1 —
candida Guss. . . . . . 1 —
cernua Hoffm. . . . . . — 50
Cupaniana Guss. . . . . — 50
Italica L.. . . . . — 50
Lilio-Hyacinthus L.. . . . — 50
monophylla Led. . . . . 1 —
nutans Smith. . . . . . — 50
— à fl. blanches . . . . 1 —
patula Red. . . . . . . — 50
pratensis W. K.. . . . . — 50
sibirica Andr. . . . . . — 50
— à fl. blanches . . . . 1 —
Taurica Schott. . . . . . 1 —
Ughii Tineo . . . . . . 1 —
umbellata Ram. . . . . . — 50
verna Hud. . . . . — 50

Scirpus

lacustris L. . . . . . . — 50
maritimus L. . . . . . . — 50

Plantes aquatiques.

Scolopendrum (Voir Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Scutellaria

alpina L.. . . . . — 50

Excellente plante naine à fleurs bleu pâle et lilas, propre à confectionner des bordures ou à garnir les rochers en plein soleil ou à mi-o. Mai-Juillet.

Scutellaria *(suite)*.

altissima L.	—	50
antirrhinoides L.	—	50
galericulata L.	—	50
Holtzeri Rgl.	—	50
Japonica Morr.	—	50
orientalis L.	—	50
rupestre Boiss.	—	50

Scrophularia

Hoppii Koch.	—	50

Scorzonera

rosea Waldst. et Kit.	2	50

Sedum

acre L.	—	50
aizoon L.	—	50
albescens Haw.	—	50
altissimum Poir.	—	50
anacampsecos L.	—	50
anglicum Hud.	—	50
annuum L.	—	50
anopetalum DC	—	50
asiaticum L.	—	50
Beoticum DC.	—	50
Bōloniense Lois.	—	50
Beyrichianum	—	50
brevifolium DC	1	50
cœruleum Wahl.	—	50
collinum Willd.	—	50
Clusianum Guss.	—	50
crassipes Wahl.	—	50
cruciatum Desf.	—	50
cyaneum Rud.	—	50
dasyphyllum L.	—	50
Douglasi Hook.	—	50
elegans Lej.	—	50
eryocarpum Sibt. et Sm.	—	50
Eversii Led.	—	50
Fabaria Koch.	—	50
farinosum Lowe.	—	50
Forsterianum Sm.	—	50
glaucum W. K.	—	50
glanduliferum Guss.	1	—
grandiflorum Hort.	—	50
Hildebrandii Fnzl.	1	—
hybridum L.	—	50
ibericum Stev.	—	50
involucratum Bieb.	—	50
Kamtschaticum Fisch.	—	50
laconicum Boiss.	1	—
latinervum Hort.	1	—

Sedum *(suite)*.

lividum Willd.	—	50
Lydium Boiss.	—	50
magellense Ten.	—	50
Maximowiczi Rgl.	—	50
maximum Sut.	—	50
Middendorfianum Maxim.	—	50
montanum Perr. et Song.	—	50
Monregalense Balb.	—	50
Neapolitanum Ten.	1	—
neglectum Ten.	1	—
Nevii Gray	—	50
Nicaense All.	—	50
Olympicum Boiss.	—	50
ovatum Rgl.	—	50
oppositifolium Sims.	—	50
oreganum Nutt.	—	50
pallidum M. B.	—	50
pruinatum Brot.	—	50
populifolium L.	—	50
pulchellum Michx.	—	50
purpurascens Koch.	—	50
reflexum L.	—	50
repens DC.	—	50
Rhodiola DC.	—	50
— var. latifolium Rgl.	—	50
rubens L.	—	50
rupestre L.	—	50
sempervivum Led. (V. Umbilicus).		
sexangulare L.	—	50
Sieboldi Sweet.	—	50
spathulifolium Hook.	1	50
spurium Bieb.	—	50
stellatum L.	—	50
Stephani Chm.	—	50
stoloniferum Gmel.	—	50
telephium L.	—	50
ternatum Mich.	1	—
Verloti Gr.	—	50
villosum L.	1	—

Les Orpins sont des plantes succulentes, très propres à garnir les rochers, les lieux arides en plein soleil; leur peu d'exigences, les nombreuses fleurs jaunes, roses, bleuâtres ou blanches qui les recouvrent, leur feuillage toujours gracieux et décoratif les recommandent à tous les amateurs.

Selaginella

Helvetica Sprg.	1	—

Jolie petite mousse rampante.

Sempervivum

acuminatum Schott.	1	—
affine Lam.	1	—
albidum Lk.	1	—
alpinum Gr. Sch.	1	—
angustifolium Kern.	1	50
arachnoideum L.	—	50
arenarium Koch.	—	50
arvernense Lam.	1	—
assimile Schott.	1	—
atlanticum Ball.	1	50
atroviolaceum Hort.	1	—
barbulatum Schott.	1	—
blandum Schott.	1	—
Bonplandi Lam.	1	—
Bordgayanum Sch.	1	—
Bourgeanum Lam.	1	—
Boutignianum Bill.	—	50
Braunii Funk.	1	50
Bungeanum Led.	1	—
calcareum Jord.	—	50
Californicum Hort.	—	50
canescens Schn.	1	—
colchicum Kotschy	1	50
Comoli Rota	1	—
— virescens (Belv.)	1	50
cornutum Schn.	—	50
Delasoiei Lehm. et Schn.	1	—
Dœllianum Lehm. et Schn.	1	—
Dolomiticum Facch.	1	—
Fauconnetti Reut.	1	—
fimbriatum Lehm. et Schn.	1	—
flabelliforme Fisch.	1	—
Funkii Br.	1	—
Gaudini Christ.	1	—

Belles fleurs jaunes.

globiferum Wulf.	1	50
globiferum L.	—	50
grandiflorum Hort.	1	—
Hausmanni Kern.	1	—
heterotrichum Schott.	1	50
Heuffeli Schott.	—	50
Hillebrandi Schott.	1	—
hirtum L.	—	50
hispidum Schott.	1	—
Hookeri V. H.	1	—
Huteri Schnittp.	1	—
Juratense Jord.	1	—
Laggeri Schott.	—	50
Lamottei (Boreau)	1	50
latifolium Hoffmsg.	1	—

Sempervivum (*suite*).

luteo viridis S. N. K.	1	50
Mettenianum Schn.	—	50
montanum L.	—	50
murale Bor.	1	—
Neilreichii Schott.	1	—
parviflorum Schn.	1	—
patens Gris.	1	—
piliferum Jord.	1	—
pilosella Schn.	1	—
Pittonii Schott.	—	50
pseudo-Ruthenicum B. Vilt.	1	50
pyrenaicum Jord.	1	—
Reginae Amaliæ Held.	—	50
rubicundum Schur.	—	50
Ruthenicum Koch.	1	—
Schlehani Schn.	1	—
soboliferum Sims.	1	—
Schottii R.	1	—
Seguieri D C.	1	—
stenopetalum Schott.	1	50
Studeri Kern.	1	50
tomentosum Schn.	—	50
triste Leichtl.	—	50
Verloti Jord.	—	50
vallesiacum Lehm.	1	—
villosum Haw.	1	—
violascens Hort.	1	—
Webbianum L. S.	1	—
Winkleri Host.	1	—
Wulfeni Hopp.	—	50

Les Sempervivum (Joubarbes) sont d'excellentes plantes à rocailles et dont on fait aussi de jolies bordures. On les élève sur les fenêtres des appartements, et le peu de soins qu'ils nécessitent en font l'une des plus précieuses plantes à cultiver. On ne saurait trop encourager les amateurs de plantes à collectionner et à cultiver ce genre.

Senecillis

Carpathica S. N. K.	1	50

Senecio

1 abrotanifolius L.	1	50
2 adonidifolius Lois.	—	50
3 alpinus L.	—	50
4 artemisiæfolius Pers.	—	50
5 carniolicus Willd.	1	50
6 cordifolius L.	—	50
7 Doronicum L.	—	50
8 incanus L.	1	—

Senecio (*suite*).

9 leucophyllus DC	2	50
10 macrophyllus Bieb.	—	50
11 niveus Willd.	1	—
12 Othonæ Bieb.	—	50
13 stenocephalus Boiss.	1	50
14 sibiricus L.	—	50
15 Songaricus Fisch.	1	—
16 uniflorus All.	1	50

Les nos 5, 8, 9, 16 sont de petites plantes basses au feuillage d'argent, élégamment découpé, aux fleurs jaunes, portées sur des tiges qui ne dépassent pas 5 à 8 cm, qui demandent la rocaille, la terre de bruyère mélangée à de la terre franche et du sable et le mi-soleil; ils craignent l'humidité et fleurissent en Mai-Juin. Le no 1 est une belle plante à feuillage vert luisant foncé, finement divisé, et à fleurs d'un jaune orangé vif, qu'on placera dans la rocaille ou en pleine terre; Juin-Juillet. No 7, à feuilles entières, à grandes fleurs d'un jaune orangé, est une belle plante décorative, haute de 20-35 cm; les nos 10, 12 et 14 sont de grandes plantes aux formes architecturales, propres à garnir les grands rochers ou la plate-bande.

Serapias (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Serratula

nudicaulis DC	1	50
radiata Bieb.	—	50
tinctoria L.	—	50

Sibbaldia

maxima L.	—	50
parviflora Willd.	—	50
procumbens L.	—	50

Sidacea

candida A. Gray	—	50
malvaeflora A. Gray	—	50
Murrayana Hort.	1	50

Jolies Malvacées très florifères, bonnes pour la pleine terre ou la rocaille.

Sideritis

hyssopifolia L.	—	50
Taurica Willd.	—	50

Silene

1 acaulis L.	—	50
2 — fortes touffes de 5 ans	1	50
3 alpina Thom.	—	50
4 caucasica Boiss.	—	50

Silene (*suite*).

5 ciliata Pour.	—	50
6 Czerei Baumg.	—	50
7 Elisabethæ Jan.	2	50
8 exscapa All.	1	50
9 flavescens W. K.	2	50
10 Frivalskyi Hamp.	1	50
11 glareosa Jord.	—	50
12 Græfferi Ten.	—	50
13 Kitaibelli Vis.	—	50
14 Lerchenfeldiana Baumg.	1	—
15 livida Willd.	—	50
16 maritima With.	—	50
17 mollissima Smith.	—	50
18 monachorum Vis.	1	50
19 multicaulis Guss.	1	50
20 nutans L.	—	50
21 parnassica Boiss.	—	50
22 petræa W. et K.	—	50
23 pseudo-ottites Besser.	—	50
24 Pumilio Wulf.	2	50
25 pusilla W. K.	—	75
26 quadrifida L.	—	50
27 Reichenbachiana Vis.	—	50
28 Rœmeri Friv.	—	50
29 rupestris L.	—	50
30 Sartorii Boiss.	—	50
31 saxifraga L.	—	50
32 Schafta Gmel.	—	50
33 Sendtneri Boiss.	—	50
34 Vallesia L.	—	75
35 Zawadsky Herb.	—	50

Les nos 1, 8 et 24 sont des plantes-boules formant des touffes comprimées, à feuillage très petit, d'un vert gai et très serré, se recouvrant en Mai-Juin de fleurs d'un rose vif. Il leur faut la rocaille et le mi-soleil; No 7 est la plus belle et la plus brillante des Silènes; fleurs très grandes, d'un rose vif, portées par une tige de 5 à 8 cm à peine; il lui faut la fissure d'un rocher et le soleil; nos 2, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 31 forment de petites touffes à feuillage fin, à fl. blanches très nombreuses qui aiment le R. et le mi-ombre; Mai-Juillet; no 32, à belles fleurs rose vif apparaissant à l'automne, réussit en pl. t. (bonne pour bordures) comme dans le R. au mi-soleil.

Shortia

galacifolia Torr. et Gray.	2	50

Silybum

Marianum Gaertn.	—	50

Sisyrinchium
anceps Lam. . . . . . . — 50
Bermudiana L. 1 50
iridifolium H. B. . . . . — 50

Skimmia
japonica Thunb. . . . . 1 —

Petit arbuste toujours vert, à feuille de laurier, et dont la fleur répand un doux parfum d'oranger.

Smilacina
stellata Desf. 1 50

Smilax
aspera L. 1 50
excelsa L. 1 50

Sobolewskya clavata Boiss. . 2 50

Soldanella
alpina L. . . . . — 50
— à fl. blanches . . . . 2 —
hybrida Kern. 2 50
minima Hoppe. 2 50
montana Willd. 2 50
pusilla Baumg. 2 50

Les Soldanelles demandent un sol spongieux, tourbeux si possible, bien drainé, une position au soleil et un arrosement très fréquent au premier printemps, au moment où se développent les boutons floraux. Elles fleurissent en Mars.

Solidago
alpestris W. K. . . . . . — 50
altissima L. . . . . . . — 50
canadensis . . . . — 50
odora Ait. . . . . — 50

Sonchus
caucasicum Bieb. . . . 2 50

Sorbus
americana Willd. . . . — 50
aucuparia L. . . . . . . 1 —
chamaemespilus Cr. . . . 1 —
Scandica Fr. . . . . . . 1 —

Spartium
junceum L. . . . . 1 —

Spergularia
rubra Presl. . . . . . . 1 —

Spigelia
Marylandica L. 2 50

Spiræa
1 Armurensis Maxim. . . 1 50
2 uncus. L. (Reine des bois) . . — 50
3 bullata Maxim. 1 50
4 digitata Willd. . . . . 1 —
5 filipendula L. . . . . . — 50
— à fl. doubles . . . . 1 —
6 lobata Murr. . . . . . — 50
7 palmata Thunb. . . . . 1 —
8 Ulmaria L. (Reine des prés) . . — 50
— à fl. doubles . . . . 1 —
— à feuilles panachées. 1 —
9 venusta Hort. . . . . . 1 —

Les n°s 4, 6, 7 sont de belles plantes vivaces, hautes de 50 c^m^ à 1 m., à belles fleurs roses disposées en panicules et fleurissant en Mai-Juin ; pl. t. ou R. ; sol frais et meuble, profond ; mi-s. Ce sont des plantes superbes et dont l'effet dans les jardins est saisissant, des Reines des prés rose vif. On ne saurait les recommander trop. Le n° 2 est le superbe panache blanc qui croît dans les bois humides de nos régions montagneuses, et qui fait merveille dans les lieux frais de nos jardins et grands rochers ; les n°s 5 et 8 offrent des fleurs également blanches, disposées en capitules plus petits et très jolis ; ils aiment les sols humides et le soleil. Toutes ces Spirées possèdent des feuillages élégants et méritent une place dans les jardins ou grands rochers. Elles fleurissent d'Avril en Juin. Le n° 3 est une petite espèce ligneuse à fl. rose vif.

Spiranthes (Voy. Foug. et Orchid. rust.).

Stachys
coccinea Jacq. 1 50
lanata Jacq. . . . . . . — 50

Bonne plante à bordures à feuillage velouté.

lavandulaefolia Vahl. . . 1 50
plumosa Gris. . . . . . — 50
sibirica Link. . . . . . — 50

Statice
auriculæfolia Guss. . . . 1 —
globulariæfolia Desf. . . 1 —
Gmelini Willd. . . . . . — 50
latifolia Sm. . . . . . . — 50
Limonium L. . . . . . . — 50
panormitana Tod. . . . 1 —
tatarica L. . . . . — 50

Très jolies et bonnes pl. vivaces pour

la pl. terre ou les rochers ensoleillés; fl. bleues, disposées en panicules plus ou moins larges et scarieuses, se conservant pour l'hiver à la manière des immortelles; excellentes pour la fleur à couper.

Stellera
Alberti Rgl. 2 50

Stipa
Calamagrotis Wahl. . . . . — 50
gigantea Lag. 1 50
pennata L. . . . . — 50

Stockesia
cyanea Hérit. 2 50

Charmante composée à fl. bleues, fleurissant en Octobre-Novembre.

Streptopus
amplexifolius DC. . . . . 1 —

Struthiopteris (Voir Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Swertia
connata Schenk. 1 50
longifolia Boiss. 1 50
perennis L. . . . . — 50
punctata Baumg. 1 50

Les Swerties sont de curieuses gentianées de tourbe et de marais; leurs fleurs violet foncé, jaunes ou blanchâtres, sont disposées en panicules dressés; Mai-Juin. R. ou pl. t.; sol poreux et frais; s. ou mi-s.

Sylphium
asteriscus L. . . . . . . — 50
Hornemanni Schrad. . . . — 50
integrifolium Mich. . . . — 50
perfoliatum L. . . . . . . — 50
trifoliatum L. . . . . . . — 50

Grandes Composées aux formes architecturales, aux fl. jaunes, fleurissant l'automne.

Symphiandra
Hoffmanni Pant. . . . . . — 50
pendula A. DC. 2 50

Campanulacées de rocailles; la première à fl. blanches, recherche l'ombre et la fraîcheur et fleurit d'Août en Novembre: ses feuilles sont décoratives, aussi bien que ses innombrables fl. en panicules de 25-50 cm. de haut. Le S. pendula est d'un bleu pâle et demande le roc et le s.

Symphitum
bulbosum Schimp. . . . . — 50
coccineum Hort. . . . . . — 50
cœruleum Hort. Angl. . . — 50
orientale L. (Psylostemon). — 50
tauricum Willd. . . . . . — 50

Talinum
crassifolium Willd. . . . 1 50

Tamarix
germanica L. . . . . . . 1 —

Tamus
communis L. 1 50

Tanacetum
Balsamita L. . . . . . . — 50
boreale Fisch. 1 50
Herderi Rgl. . . . . . . 1 —
leucophyllum Rgl. . . . . 1 —
vulgare L. . . . . — 50

Pl. aromatiques, à feuillage ornemental, à beaux panicules de fleurs jaune vif; Août-Octobre, pl. t., s.

Telekia
speciosisisma DC. . . . . . — 50

Telephium
Imperati L. . . . . — 50

Teucrium
1 aureum Schreb. . . . . 1 —
2 capitatum L. . . . . . — 50
3 chamædrys L. (Germandrée). — 50
4 flavum L. . . . . — 50
5 lucidum L. . . . . . . — 50
6 montanum L. . . . . . . — 50
7 orientale L. . . . . . . — 50
8 Polium L. . . . . — 50
9 pyrenaicum L. . . . . . — 50
10 Scorodonia L. . . . . . — 50

Jolies Labiées naines et touffues, aromatiques et à feuillage persistant; les nos 1 et 8 ont les feuilles gris d'argent, les fl. jaunâtres et forment de petites touffes serrées; nos 2, 4, 5, à fl. jaunes ou blanches, sont des pl. plus élevées; nos 6 et 9 sont tout à fait nains et rampants, à fl. jaunâtres; nos 3, 7 et 10, à fl. roses, forment des touffes plus fortes; toutes aiment le grand soleil et la rocaille, mais peuvent se cultiver également en pl. terre et constituer de bonnes bordures.

Thalictrum

1 ambiguum Schl.	—	50
2 anemonoides Mich.	1	—
— à fl. doubles	2	50
3 alpinum L.	1	—
4 aquilegifolium L.	—	50
5 Baikalense Turcz.	—	50
6 calabricum Sprgl.	—	50
7 collidum Reich.	—	50
8 Delavayi Franch.	2	50
9 fœtidum L.	—	50
10 Kemense Fries.	—	50
11 laserpitiifolium Willd.	—	50
12 mediterraneum Jord.	—	50
13 minus L.	—	50
14 purpurescens L.	—	50
15 saxatile Schl.	—	50
16 sibiricum L.	—	50

Les Pigamons sont de bonnes pl. viv. pour la plate-bande ou le R.; leurs feuillages très délicats et élégamment découpés comme certaines frondes de Fougères, leurs fleurs aux nombreuses étamines, leur rusticité les recommandent à tous. N°s 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16 sont des plantes plus ou moins fortes, hautes de 15 cm. à plus d'un mètre suivant les espèces, à fl. jaunâtres nombreuses, au feuillage élégant; n° 2 est une très petite pl. à fleurs blanches, réclamant la rocaille (mi-soleil), fleurissant en Mai; n° 4 est l'une des plus recommandables, tant à cause de son beau panache de fleurs lilas ou blanches que par son gracieux feuillage (Avril-Mai); il fait admirablement dans les Fougères, sous-bois ou grands rochers mi-ombragés; on le cultive aussi en plates-bandes; enfin le n° 8 est l'une des meilleures introductions dues au Museum de Paris; c'est une superbe pl. à fleurs roses qui est appelée à jouer un grand rôle dans les cultures.

Thermopsis

fabacea DC.	1	—

Thlaspi

alpestre L.	—	50
cepæfolium Koch.	—	50
rotundifolium Gaud.	1	50

Jolis crucifères à fleurs blanches ou lilas. R.: mi-s.

Thymus

bracteosus Vis.	—	50
capitatus Link.	1	—

Thymus (*suite*).

comosus Heuf.	—	50
citriodorus Schreb.	—	50
Herba Baronæ Lois.	1	—
lanceolatus Desf.	—	50
lanuginosus Mill.	—	50
pannonicus All.	—	50
Serpyllum L.	—	50
villosus L.	1	50
Zygis L.	—	50

Les Thyms sont de petites pl. aromatiques, à rameaux fins et ténus, souvent couchés sur le sol où ils forment de jolies touffes gazonnantes se recouvrant, en Juillet-Septembre, de fleurs roses ou jaunes. R. ou plates-bandes. s.

Tiarella

cordifolia L.	—	50

Tipularia (Voir Cat. Foug. et Orchid. rust.)

Toffieldia

borealis Wahl.	1	50
calyculata Wahl.	—	50

Tradescantia

Virginica L.	—	50
grandiflora alba	—	50

Bonnes pl. vivaces pour la pl. terre; Juin-Septembre.

Tragopogon

ruber Gmel.	—	50

Tricystis

hirta Hook.	—	50
macropoda Hort.	1	—

Trientalis

europæa L.	2	50

Trifolium

alpinum L.	1	50
alpestre L.	—	50
polyphyllum C. A. M.	2	50
saxatile All.	1	—

Trillium

cernuum L.	—	50
erectum L.	1	50
erythrocarpum Mich.	1	50
grandiflorum Salisb.	1	50
petiolatum Pursh.	1	50
pusillum Mich.	1	50
nivale Rid.	1	50

Trillium (*suite*).

ovatum Pursh. 1 50
sessile L. 1 50

Les Trilles sont à l'Amérique sept. ce que la Parisette à quatre f. est à nos bois ; ils sont construits sur le nombre 3 et fort curieux à étudier. Leurs fleurs sont blanches, roses ou brun chocolat suivant les espèces. Sol riche en humus; mi-o.; fraîcheur. Mai-Juin.

Tritoma

Uvaria Link. . . . . . . 1 —

Trollius

altaicus C. A. M. . . . . . 1 —
aconitifolius Hort.. . . . 1 —
americanus Mhl. . . . . . 1 —
aurantiacus Rgl. . . . . . 1 —
asiaticus L.. . . . . . . 1 —
aureus Tausch.. . . . . . 1 —
brevipedunculatus Rgl. . . 1 —
caucasicus Ledeb. . . . . 1 —
dschungaricus Rgl. . . . . 1 —
europœus L. . . . . — 50
giganteus Hort. . . . . . 1 —
humilis Crz. . . . . 1 —
Ledebourii Spr. . . . . . 1 —
napellifolius DC. . . . . 1 —
patulus Salisb. . . . . . 1 —
pedunculatus Rgl. . . . . 1 —
polysepalus Rgl. . . . . . 1 —

Les Trolles sont de gros boutons d'or à fleur souvent globuleuse, parfois étalée, d'un jaune pâle, vif ou orangé suivant les espèces, à feuilles palmées, d'un vert foncé et luisantes; qui fleurissent en Avril-Mai-Juin. R. ou pl. t; sol riche en humus et frais; s. ou mi-s.

Tulipa

biflora T. . . . . 1 —
Celsiana Red. . . . . . . 1 —
Clusiana Vent. . . . . . . 1 —
Didieri Jord. . . . . . . 1 —
Gesneriana L. . . . . . . — 50
Greigii Rgl. . . . . 1 —
Kolpakowskiana Rgl. . . . 1 —
macrospila Hort. . . . . . 1 —
Maurianensis Billet. . . . 1 —

(Nouvelle Tulipe trouvée dans la Maurienne).

maleolens Reb.. . . . . . 1 —
montana Lindl. . . . . . . 1 —

Tulipa (*suite*).

monstrosa Hort. . . . . . 1 —
oculus solis DC. . . . . . — 50
Ostrowskiana Rgl. . . . . 1 —
persica. . . . . 1 —
sylvestris L. . . . . . . — 50
— major. . . . . . . — 50
Turcica Roth. . . . . . . 1 —
turkestanica Rgl. . . . . 1 —
viridiflora Hort. . . . . — 50

Tunica

Saxifraga L. . . . . . . — 50

Typha

angustifolia L. . . . . . 1 —
latifolia L. . . . . 1 —
minima Funk. . . . . . . 1 —

Les Massettes sont de bonnes pl. aquatiques ou amphybies, que leurs larges pompons cylindriques d'un brun noir, leurs feuilles élégantes et leurs formes architecturales recommandent à tous les amateurs.

Ulex

europæus L. . . . . 1 —

Umbilicus

aizoon Fenzl. . . . . . . 1 —
chrysanthus Boiss.. . . . — 50
ciliolatus Rgl. . . . . . 1 —
globulariæfolius Fenzl. . . 1 —
Libanoticus DC. . . . . . 1 —
pendulinus DC. . . . . . . 1 —
Semenowi Herd. . . . . . 1 —
Sempervivum DC.. . . . . 1 50
spinosus DC. . . . . 1 —
turkestanicum . . . . . . 1 —

Les Ombilics sont voisins des Joubarbes; U. Sempervivum, ou Sedum Semp. est une brillante espèce caucasienne qui fait grand effet dans les rochers. U. Semenowi est également une pl. superbe, aux épis de fleurs blanches, striées de rouge; R.; s.

Uniola

latifolia Mich. . . . . . — 50

Jolie Graminée à épis larges et plats.

Uvalaria

grandiflora Smith.. . . . 1 50
perfoliata L. 1 50

Vaccinium

Myrtillus L. (Myrtille). . . 1 —
microcarpon Ait. 2 50

Vaccinium (*suite*).

Pennsylvanicum Lam.	2	50
Oxycoccos L.	1	—
Uliginosum L.	1	—
Vitis Idæa L.	1	—

Jolis arbustes de terre de bruyère.

Valeriana

Alliariæfolia Vahl.	—	50
alpestris Stev.	1	50
asarifolia Dufr.	1	50
Celtica L.	1	50
dioica L.	—	50
globulariæfolia Ram.	1	50
montana L.	—	50
officinalis L.	—	50
Phu L.	—	50
saxatilis L.	1	50
Saliunca L.	—	50
Supina L.	1	50
tripteris L.	—	50
tuberosa L.	1	50

Les Valérianes, bien connues pour leurs propriétés pharmaceutiques, sont de jolies pl. d'ornement pour les rocailles. Les espèces de basse taille, telles que saxatilis, saliunca, supina, tuberosa font admirablement entre les rochers, au mi-soleil. La Val. Celtica est célèbre par ses propriétés aromatiques et l'usage qu'on fait d'elle dans la composition des parfums d'Orient. Cette pl. a été recherchée avec une telle avidité qu'elle est devenue fort rare.

Vallisneria

spiralis L. (pl. aquatique).	2	50

Vella

spinosa Boiss.	2	50

Veratrum

album L.	1	—
nigrum L.	1	—

Superbes plantes ornementales, à grand feuillage décoratif.

Verbascum

Blattaria L.	—	50
Chaixii Vill.	—	50
floccosum W. et K.	—	50
heteromallum Panc.	—	50
Lychnitis L.	—	50
mucronatum Lam.	—	50
niveum Ten.	—	50

Verbascum (*suite*).

Olympicum Boiss.	—	50
Phœniceum L.	—	50
— à fl. variées	—	50

Verbena

venosa Gill. et Magn.	1	50

Vernonia

altissima Nutt.	—	50
eminens Bisch.	—	50
præalta Bess.	—	50

Veronica

1 Allioni Vill.	1	50
2 alpina L.	—	50
3 aphylla L.	—	50
4 austriaca L.	—	50
5 bellidioides L.	—	50
6 caucasica Bieb.	—	50
7 chamaedris L.	—	50
8 crassifolia Sweet.	—	50
9 dichrus Schott.	—	50
10 elegans carnea DC.	1	—
11 fruticulosa L.	—	50
12 gentianoides Vahl.	—	50
13 japonica Steud.	—	50
14 incana L.	—	50
15 Kœnitzii Reich.	—	50
16 Kotschyana Benth.	—	50
17 laciniata Ait.	—	50
18 longebracteata Link.	—	50
19 longifolia L.	—	50
20 monticola Trautv.	1	50
21 neglecta Vahl.	—	50
22 nivalis Schur.	—	50
23 officinalis L.	—	50
24 orchidea Crantz.	—	50
25 orientalis Mill.	—	50
26 paniculata Pall.	—	50
27 pinnata L.	—	50
28 Ponæ Gouan.	—	50
29 prostrata L.	—	50
30 saxatilis L.	—	50
— alba	1	—
— rosea	1	—
31 repens DC	—	50
32 serpyllifolia L.	—	50
33 sibirica L.	—	50
34 spicata L.	—	50
— à fleurs blanches	1	—
35 subsessilifolius Hort.	1	—
36 urticæfolia L.	—	50

Veronica *suite*).

37 virginica L. . . . . . . — 50
38 Waldsteiniana Schott. . . — 50

Les nos 2, 3, 5, 11, 20, 22, 30 et 32 sont de petites espèces alpines à fleurs bleues, formant des touffes étalées ou denses, très propres à garnir les rochers au mi-soleil.; elles fleurissent d'Avril en Juin; no 1 est une rare et belle espèce du Dauphiné, à belles fleurs bleu foncé disposées en épis courts et dressés, et dont les rameaux, étalés sur le sol, portent de belles feuilles d'un vert foncé. Nos 10, 12, 14, 16, 24, 27, 31 et 38 sont des plantes basses, à fleurs bleues, bonnes pour R. ou plates-b. (bordures), au soleil et fleurissant de Mai en Août; le no 23 est excellent pour garnir les sous-bois ou les lieux arides et ombragés. Les autres espèces sont de fortes plantes vivaces pour la plate-bande, à fleurs bleu foncé ou clair, roses ou blanches, disposées en épis simples ou paniculés et d'un effet charmant dans les plates-bandes et les grands rochers. Ces plantes sont également excellentes pour la fleur coupée, et fleurissent durant une grande partie de l'été.

Véroniques de la Nouvelle-Zélande

Veronica

anomala Armstr. . . . . 1 —
buxifolia Benth. . . . . 1 —
carnosula Hook. f. . . . 1 —
Collensoides Hook. f. . . 1 —
cupressoides Hook. f. . . 1 —
elliptica Forst. . . . . 1 —
glauco-cœrulea Armstr. . 1 —
ligustifolia Cuningh . . 1 —
Lyalli Hook f. . . . . . 1 —
lycopodioides Hook f. . . 2 50
monticola Armstr. . . . 1 —
pimeloides Armstr. . . . 1 —
Traversi Hook. f. . . . 1 —
vernicosa Hook. f. . . . 1 —

Les Véroniques de la Nouvelle Zélande sont de charmants arbrisseaux à feuillage persistant l'hiver; il y en a de toutes formes et de plusieurs teintes et toutes sont fort jolies. La plupart sont rustiques sous notre climat et constituent un élément très important pour l'ornementation de nos rocailles.

Vesicaria

utriculata Lam. . . . . — 50

Vicia

picta L. 1 50
onobrychioides L. 1 50

Vinca

herbacea W. K. (la Pervenche des Carpathes) . . . . 1 —
major L. . . . . — 50
minor L. . . . . — 50

Les Pervenches sont bien connues dans leurs trois couleurs naturelles et sont depuis longtemps utilisées dans les jardins pour l'ornementation des sous-bois et des lieux ombragés.

Vincetoxicum

alpinum Schott. . . . . — 50
nigrum L. . . . . — 50

Viola

1 alpina Jacq. 2 50
2 altaica Pall. . . . . . 1 —
3 arenaria DC. 2 50
4 biflora L. . . . . . . — 50
5 calcarata L. . . . . . — 50
— à fl. blanches . . . 1 —
— à fl. jaunes . . . . 1 —
6 canadensis L. . . . . — 50
7 canina L. . . . . . . — 50
8 cornuta L. . . . . . . — 50
— à fl. blanches . . . — 50
— à fl. jaunes . . . . — 50
9 cucullata Ait. . . . . — 50
— à fl. blanches . . . — 50
10 declinata Waldst. et Kit. . 2 50
11 elatior Fries. . . . . — 50
12 heterophylla Bert. . . . 1 50
13 Holtzeri Rgl. . . . . . — 50
14 Jooi Janka 1 50
15 lutea Huds. . . . . . — 50
16 multifida Willd. . . . — 50
17 Mumbyana Boiss. . . . 1 —
18 Nicolaï Pant. . . . . . 1 —
19 odorata L. . . . . . . — 50
20 palmata L. . . . . . . 1 —
21 Patrini DC 1 50
22 pedata Pursh. 1 50
23 — bicolor Hort. . . . 2 50
24 Pensylvanica Mich. . . . — 50
25 pinnata L. . . . . . . 1 —
26 pubescens Ait. . . . . 1 —
27 Rothomagensis Desf. . . — 50
28 rotundifolia Mich. . . . 2 50

Viola (*suite*).

29 striata Ait. . . . . . . 1 —
30 Sudetica Willd. . . . — 50
31 Zoyzii Wulf. . . . . . 1 —

Les nos 2, 5, 8, 12, 13, 15, 17, 27, 30 et 31 sont des Pensées de montagnes à fleurs généralement bleues ou violettes, blanches chez plusieurs variétés, jaunes chez les nos 15 et 31; R. ou pl. t.; mi-soleil ou s. N° 1 est une superbe et rare Pensée du Tyrol à macules violet foncé; R., mi-s. Nos 4, 26 et 28 sont des violettes à fleurs jaunes qui demandent le R. et un emplacement au frais. Nos 3, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 24 et 29 sont des violettes, parfumées ou non, à fleurs bleues, violettes ou blanches. Nos 16, 20, 22, 23 et 25 ont des feuilles palmées ou profondément divisées et des fleurs lilas ou violettes, bicolores chez n° 23. R. ou pl. t.; s. ou mi-s. Toutes les violettes et les Pensées de montagnes fleurissent de Mars en Mai.

Wahlenbergia (V. Edrayanthus et Platycodon).

Waldstenia

Geoides Willd. . . . . . — 50

Wahlbergella

pauciflora Fries. . . . — 50

Wittadenia

triloba DC . . . . . . — 50

Wulfenia

Amherstiana Benth. . . 2 50
carinthiaca Jacq. . . . — 50
Wallichii Leichtl. . . . 2 50

Woodsia (V. Cat. Foug. et Orchid. rust.).

Woodwardia (Idem).

Prière de conserver ce Catalogue, attendu que nous publierons, désormais, des LISTES SUPPLÉMENTAIRES seulement.

Les personnes qui n'en feraient pas usage sont priées de bien vouloir le faire circuler, et nous serons reconnaissants à ceux de nos clients qui voudront bien nous adresser leurs amis ou faire circuler nos listes de plantes ou graines.

Des Plantes alpines

Depuis quelques années, la culture des plantes de montagnes a pris un développement considérable dans le monde de l'horticulture. Il n'est plus guère de beau jardin qui n'ait son « alpinum » ou sa petite rocaille. On a abandonné le style guindé qui nous a valu les corbeilles plates ou les « mosaïcultures » pour s'adonner de plus en plus aux cultures des plantes vivaces et rustiques ; au *jardin-tapis* on commence à préférer un arrangement pittoresque et naturel, les rochers, les gazons fleuris et émaillés de fleurs variées, les sous-bois tout rayonnants de corolles harmonisant leurs teintes et répandant leur délicieux parfum dans l'air. Le *jardin alpin* a désormais sa place acquise dans tout parc ou dans toute propriété de goût.

Le Jardin alpin d'acclimatation à Genève, qui fut créé en 1884 dans le but d'aider à ce mouvement qui commençait alors à se produire, a le mérite d'avoir été l'un des premiers qui se sont occupés de l'acclimatation des plantes alpines. Ces cultures furent établies déjà en 1876 dans ma propriété d'Yverdon (Vaud), et le catalogue de ces plantes fut publié en 1877. Depuis lors, grâce à une expérience de tous les jours, j'en suis arrivé à élever presque toutes ces plantes par le moyen du semis, le seul moyen naturel et propice à leur développement. De nombreux témoignages parus dans les journaux anglais, américains, suédois, autrichiens, allemands, français, italiens, danois, hollandais, belges et suisses, prouvent que les plantes que nous acclimatons à Genève réussissent bien dans les jardins de ces différents pays. D'innombrables attestations de nos clients, dans tous les pays de l'Europe, nous démontrent que nous avons eu raison d'entrer dans cette voie, et il est certain que, dans le monde horti-

cole, le jardin alpin d'acclimatation a sa place marquée. Nous avons obtenu 38 médailles d'or, de vermeil et d'argent dans autant d'Expositions différentes, tant en Suisse qu'à l'étranger.

C'est donc avec la plus entière confiance que nous nous adressons à nos clients comme aux personnes qui ne nous ont pas encore honoré de leurs commandes, pour leur recommander notre jardin qui, pour poursuivre le but phytophyle qu'il s'est proposé, a besoin de l'appui de tous.

Nous nous chargeons de la création de rochers et de l'arrangement de jardins alpins, et nous serons heureux de donner aux amateurs qui les désirent, toutes les informations sur les soins à apporter aux plantes de montagnes et sur la manière de les disposer dans le jardin. Le volume que j'ai publié en 1885 : *Les Plantes des Alpes*, étant complétement épuisé et introuvable à l'heure qu'il est, un nouveau livre sur la matière paraîtra d'ici à une année sous le titre : *Les Plantes de montagnes*. En attendant, nos clients nous trouveront prêts à les renseigner sur le mode de culture des espèces délicates, que nous n'avons pas pu donner tout au long dans ce catalogue.

Le Jardin alpin d'acclimatation cultive à peu près toutes les plantes de montagnes qui ont été acclimatées jusqu'à ce jour; la plupart sont élevées en pots pour la vente et se trouvent au Jardin du chemin Dancet. Notre collection de Plantes vivaces, que nous cherchons à rendre aussi complète que possible, est cultivée dans notre succursale des Grands-Acacias, sur la route de Lancy, où nous avons aussi établi un petit *Alpinum-modèle*.

La plupart de nos Plantes alpines peuvent s'expédier durant toute l'année, grâce à la culture en pots ; les Plantes vivaces, par contre, ne s'expédient que de Février en Juin, et de Septembre en Novembre.

Un catalogue de Graines, qui paraît en Novembre, donne la liste de toutes les espèces récoltées par nous, soit ici à Genève, soit dans les montagnes.

H. Correvon.

EXPÉDITIONS

Une collection de 12 plantes alpines, à notre choix et coûtant 5 francs (50 cent. à 1 franc d'emballage), pèse environ 3 kilos.

Pour les colis postaux de 5 kilos (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, France, Hollande, Italie, Luxembourg et Roumanie) nous pouvons emballer 20 plantes dans la caisse.

Les tarifs pour l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche étant peu élevés, nous envoyons par la voie des messageries les colis qui dépassent le poids du « colis postal » ; quand ce poids est trop élevé pour le transport postal nous choisissons la grande vitesse.

La livre sterling vaut 25 francs.
Le shelling. . . . 1 » 25

COLIS POSTAUX POUR L'ÉTRANGER :

							Fr.	C.
De Genève	en	Allemagne	5	kilos.	Port :		1	—
»		Autriche-Hongrie	5	»	»		1	—
»		Belgique	5	»	»		1	50
»		Bulgarie	3	»	»		2	25
»		Danemark	5	»	»		1	50
»		Espagne	3	»	»		1	75
»		France.	5	»	»		1	—
»		Grande-Bretagne et Irlande	1	»	»		1	85
»		»	3	»	»		2	35
»		»	5	»	»		3	30
»		»	10	»	»		6	70
»	pour	Londres	3	»	»		2	20
»		»	5	»	»		2	40
»		»	10	»	»		4	70
»	en	Hollande	15	»	»		6	25
»		»	5	»	»		1	50
»		Italie	5	»	»		1	25
»		Luxembourg.	5	»	»		1	25
»		Norvège et Suède	3	»	»		2	50
»		Portugal	3	»	»		2	25
»		Roumanie.	5	»	»		1	75
»		Serbie	3	»	»		1	75